


المهندس

في

الفيزياء



الصف الأول الثانوى

اعداد الاستاذ

محمد الصباح

ملاحظات هامة لدراسة الفيزياء

اولا : الوحدات الاساسية


| Quantity الكمية | نظام جاوس c.g.s | النظام المتري m.k.s | التحويل |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---|
| Length الطول | Cm | Meter | 1 cm = 10^{-2} meter |
| Mass الكتلة | gm | Kg | 1 gm = 10^{-3} kg |
| Time الزمن | Sec | Sec | 1 sec = 1 sec |
| Area المساحة | cm ² | m ² | 1 cm ² = 10^{-4} m ² |
| Volume الحجم | cm ³ | m ³ | 1 cm ³ = 10^{-6} m ³ |
| Density الكثافة | gm/cm ³ | Kg/m ³ | 1 gm / cm ³ = 10^3 kg / m ³ |
| Force القوة | Dyne | Newton | 1 dyne = 10^{-5} N |
| Pressure الضغط | Dyne/cm ² | N/m ² | 1 dyne / cm ² = 10^{-1} N/m ² |
| Energy (Work) الطاقة (الشغل) | erg | Joule | 1 erg = 10^{-7} J |
| Power القدرة | erg / sec | J/sec = Watt | 1 erg/ sec = 10^{-7} Watt |
| Magnetic Field المجال المغناطيسى | gauss | Tesla | 1 G = 10^{-4} T |

ثانيا : المضاعفات والكسور :

| المضاعفات | الكسور |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1 Kilo(k) = 10^3 | 1 milli (m) = 10^{-3} |
| 1 mega(M) = 10^6 | 1 micro (μ) = 10^{-6} |
| 1 giga (G) = 10^9 | 1 Nano (n) = 10^{-9} |
| 1 Tera = 10^{12} | 1 Pico (P) = 10^{-12} |

ثالثا : الهندسة وحساب المثلثات

١- القياس الدائرى



يتناسب طول القوس S لقوس دائرى مع نصف القطر r وذلك عند ثبوت الزاوية

$$\theta = \frac{s}{r} \Leftrightarrow \theta = sr \quad \text{حيث } \theta$$

٢- المساحات والحجوم

| | | | | | |
|--|--|----------|--|--|-------------------|
| | <p>الحيط = $2\pi r$</p> <p>المساحة = πr^2</p> | الدائرة | | <p>مساحة السطح = $4\pi r^2$</p> <p>الحجم = $\frac{4}{3}\pi r^3$</p> | الكرة |
| | <p>الحيط = $2LW$</p> <p>المساحة = LW</p> | المستطيل | | <p>مساحة السطح = $2\pi rL$</p> <p>الحجم = $\pi r^2 L$</p> | الأسطوانة |
| | <p>الحيط = $4L$</p> <p>المساحة = L^2</p> | المربع | | <p>مساحة الاسطح = $2(Lh + hw + Lw)$</p> <p>الحجم = LWh</p> | متوازى المستطيلات |
| | <p>المساحة = $\frac{1}{2}bh$</p> | المثلث | | <p>مساحة وجه المكعب = L^2</p> <p>مساحة أوجه المكعب = $6L^2$</p> <p>حجم المكعب = L^3</p> | المكعب |

٣- قيم الدوال المثلثية للزوايا الشائعة الاستخدام :

| θ | $\sin \theta$ | $\cos \theta$ | $\tan \theta$ |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0° | 0 | 1 | 0 |
| 30° | $1/2$ | $\sqrt{3}/2$ | $1/\sqrt{3}$ |
| 45° | $\sqrt{2}/2$ | $\sqrt{2}/2$ | 1 |
| 60° | $\sqrt{3}/2$ | $1/2$ | $\sqrt{3}$ |
| 90° | 1 | 0 | ∞ |

٤- الدوال المثلثية

| | | | |
|--|--|--|---|
| | $\sin \theta = \frac{a}{c}$ | $\cos \theta = \frac{b}{c}$ | $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{a}{b}$ |
| | $\sin \theta = \cos (90^\circ - \theta)$ | $\cos \theta = \sin (90^\circ - \theta)$ | $\cot \theta = \tan (90^\circ - \theta)$ |
| | $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ | $\cos(-\theta) = \cos \theta$ | $\tan(-\theta) = -\tan \theta$ |
| | $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ | | |

رابعاً : الأسس العشرية

$$10^0 = 1$$

$$10^1 = 10$$

$$10^2 = 10 \times 10 = 100$$

$$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$$

$$10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10000$$

$$10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100000$$

$$10^n \times 10^m = 10^{n+m}$$

$$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$10^{-2} = \frac{1}{10 \times 10} = 0.01$$

$$10^{-3} = \frac{1}{10 \times 10 \times 10} = 0.001$$

$$10^{-4} = \frac{1}{10 \times 10 \times 10 \times 10} = 0.0001$$

$$10^{-5} = \frac{1}{10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10} = 0.00001$$

$$\frac{10^n}{10^m} = 10^{n-m}$$

معادلة الخط المستقيم

المعادلة العامة للخط المستقيم توضح على الصورة التالية :

$$y = m x + c$$

حيث y هو المتغير الممثل على المحور الصادي و x هو المتغير

الممثل على المحور السيني و m هو ميل الخط المستقيم و c هو

الجزء المقطوع من الجزء الموجب للمحور y وتمثل بيانياً

بالشكل المقابل ويكون ميل الخط المستقيم هو :

$$m = \tan \theta = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

حيث θ هى الزاوية التى يصنعها الخط المستقيم مع المحور x .

ونفس الشيء إذا كانت المعادلة على الصورة : $y = m x - c$

لكن فى هذه الحالة يكون C هو الجزء المقطوع من الجزء السالب

للمحور Y ويكون ميل الخط المستقيم هو :

$$m = \tan \theta = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

ملحوظة

نقطة B يكون عندها قيمة $Y = 0$ وبالتعويض فى

$$0 = m x - c$$

المعادلة الاساسية

$$m = \frac{c}{x}$$

إذا

$$m x = c$$

أى ان

وعندما يكون الجزء المقطوع من محور Y مساوياً للصفر أى $C = 0$

تصبح المعادلة على الصورة :

$$Y = m X$$

وهى تمثل علاقة خط مستقيم يمر بنقطة الاصل $(0, 0)$ ويكون

:

$$m = \tan \theta = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

الفصل الأول

القياس الفيزيائي

| | |
|---------------------|---|
| تعريف القياس | هو عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى من نوعها (تسمى وحدة القياس) لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الثانية . |
| أهمية القياس | تحول مشاهدتنا الى مقادير كمية يمكن التعبير عنها بواسطة الأرقام ، فمثلا وصف درجة حرارة شخص بأنها مرتفعة غير دقيق علمياً ، والأفضل أن يتم قياس درجة حرارة الشخص باستخدام الترمومتر لمعرفة قيمتها فيقال أن درجة حرارته (40 ⁰ C) مثلاً . |
| عناصر القياس | (١) الكميات الفيزيائية . (٢) أدوات القياس . (٣) وحدات القياس . |

أولاً : الكميات الفيزيائية

- الكميات التى نتعامل معها يومياً مثل : الكتلة ، الزمن ، الطول وغيرها تسمى كميات فيزيائية .
- يمكن تصنيف الكميات الفيزيائية الى :

| كميات فيزيائية أساسية | كميات فيزيائية مشتقة |
|---|--|
| هى كميات فيزيائية لا تعرف بدلالة كميات فيزيائية أخرى . أو هى الكميات التى لا يمكن اشتقاقها من كميات أخرى . | هى كميات فيزيائية تعرف بدلالة الكميات الفيزيائية الأساسية . أو هى الكميات التى يمكن اشتقاقها (استنتاجها) بدلالة الكميات الفيزيائية الأساسية . |
| من أمثلتها الطول - الزمن - الكتلة | من أمثلتها الحجم - السرعة - العجلة . |
| تطبيق : ١- طول المسطرة 20 cm . ٢- قطع المتسابق مسافة 5 km . ٣- كتلة البرتقال 2 kg . | تطبيق : ١- مساحة المستطيل = الطول × العرض ٢- حجم متوازي المستطيلات = الطول × العرض × الارتفاع $V_{OL} = L_1 \times L_2 \times L_3$ أي أن : المساحة والحجم مشتقان من الطول . |

تكامل الفيزياء مع الرياضيات

- يتم التعبير عن الكميات الفيزيائية وعلاقتها ببعضها البعض بالمعادلات الرياضية .

المعادلة الرياضية الفيزيائية

هى صورة مختصرة لتوصيف فيزيائى ذات مدلول معين يسمى المعنى الفيزيائى.

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|---|---|
| ١ | تعتبر الكتلة من الكميات الفيزيائية الأساسية | لأنها كمية معرفة بذاتها لا تحتاج لكميات فيزيائية أخرى تعرف بدالاتها . |
| ٢ | تعتبر السرعة من الكميات الفيزيائية المشتقة | لأنه يمكن التعبير عنها بدلالة الكميات الأساسية الطول والزمن حيث ان السرعة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$ أي أن : السرعة مشتقة من الطول والزمن . |

ثانياً: أدوات القياس

قديمًا: كان الانسان يتخذ ١- اجزاء جسمه كوسيلة لقياس الطول ، مثل الذراع وكف اليد والقدم .
٢- الظواهر الطبيعية كوسيلة لقياس الزمن ، مثل شروق وغروب الشمس ودورة القمر .
حديثًا: تطورت وتنوعت نظم القياس فى كل دولة نتيجة للتطور الصناعي الهائل والتي ساعدت الانسان على وصف الظواهر بدقة والتوصل الى حقائق الاشياء .

| بعض أدوات القياس قديمًا وحديثًا | | | | الكمية |
|---|---|---|--|--------|
|  |  |  |  | الطول |
| الميكرومتر | القدمة ذات الورنية | المسطرة | الشريط المترى | |
|  |  |  |  | الكتلة |
| ميزان رقمى | ميزان ذو الكفة الواحدة | ميزان ذو الكفتين | ميزان روماني | |
|  |  |  |  | الزمن |
| ساعة رقمية | ساعة الإيقاف | ساعة البندول | الساعة الرملية | |

ثالثاً: وحدات القياس

لكل كمية فيزيائية (أساسية أو مشتقة) وحدة قياس تميزها لأن أى مقدار بدون تمييز ليس له معنى ، فمثلاً :

كتلة جسم = 5 kg

لها معنى لان لها وحدة قياس تميزها

كتلة جسم = 5

ليس لها معنى لأنها بدون وحدة قياس تميزها

| الإجابة | علل لما يأتى |
|--|---|
| لان أى مقدار بدون تمييز ليس له معنى لذلك لابد من وحدات قياس للتعبير الكامل عن الكميات الفيزيائية . | لا تكفى الأرقام للتعبير عن الكميات الفيزيائية |

يوجد فى العالم عدة أنظمة لتحديد الكميات الفيزيائية الأساسية ووحدات قياسها ومنها : النظام الفرنسى - النظام البريطانى . - النظام المترى ، الذى تم تطويره ليصبح النظام الدولى (النظام المترى المعاصر) .

| وحدات القياس | | | الكمية الأساسية |
|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
| النظام الفرنسى (نظام جاوس) (C . G . S) | النظام البريطانى (F . P . S) | النظام المترى (M . K . S) | |
| ستيمتر | قدم | متر | الطول |
| جرام | باوند | كيلو جرام | الكتلة |
| ثانية | ثانية | ثانية | الزمن |

تم إضافة أربع وحدات للنظام المتري السابق وأصبح على الصورة :

النظام الدولى للوحدات (SI)

| م | الكمية الفيزيائية | الوحدة فى النظام الدولى |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| ١ | الطول | Meter (m) |
| ٢ | الكتلة | Kilogram (Kg) |
| ٣ | الزمن | Second (s) |
| ٤ | شدة التيار الكهربى | Ampere (A) |
| ٥ | درجة الحرارة المطلقة | Kelvin (K) |
| ٦ | كمية المادة | Mole (mol) |
| ٧ | شدة الإضاءة | Candela (cd) |
| ثم أضيفت وحدتان إضافيتان هما : | | |
| ٨ | الزاوية المسطحة | Radian |
| ٩ | الزاوية المجسمة | Steradian |

علماء أفادوا البشرية

| أحمد زويل | وليام تومسون |
|--|--|
| عالم مصري . | عالم بريطاني . |
| حصل على جائزة نوبل عام ١٩٩٩ م. | أحد أبرز لعلماء الذين طوروا النظام المتري . |
| استخدم الليزر فى دراسة التفاعلات الكيميائية بين الجزيئات والتي تحدث فى فترة زمنية تقاس بالفيمتو ثانية $(10^{-15} s)$. | قام بتعيين درجة الصفر المطلق على مقياس (كلفن) لدرجات الحرارة بدقة تامة ووجد أنها تساوى $(- 273^{\circ} C)$. |

الوحدات المرجعية (المعيار)

هى الكمية التى تستخدم لنقارن بها الكميات الفيزيائية الأخرى التى من نفس نوعها وتتميز بـ:

- ١ الدقة الى أقصى حد ممكن .
- ٢ ثابتة باختلاف الظروف المحيطة .
- ٣ غير قابلة للتلف .

أولاً : معيار الطول (المتر)

- يعتبر الفرنسيون أول من استخدم المتر كوحدة عيارية لقياس الطول .

هو المسافة بين علامتين محفورتين عند نهايتى ساق من سبيكة البلاتين - الايريديوم محفوظة عند درجة الصفر سيلزيوس فى المكتب الدولى للموازين والمقاييس بالقرب من باريس .

المتر العيارى

تغير تعريف المتر العيارى الى المتر العيارى الذرى بحثاً عن التعريف الأكثر دقة حيث تصل نسبة الخطأ فيه الى أجزاء من الميكرون.

ملحوظة

المتر العيارى الجديد (الذرى)

يساوى عدد معلوم (1650763.73) من الأطوال الموجية للضوء الأحمر - البرتقالى المنبعث فى الفراغ من ذرات نظير عنصر الكريبتون ذى الكتلة الذرية 86 فى أنبوبة تفريغ كهربائى بها غاز الكريبتون .

ثانياً : معيار الكتلة (الكيلوجرام)

الكيلوجرام العيارى :

يساوى كتلة اسطوانة من سبيكة البلاتين - الايريديوم ذات أبعاد محددة محفوظة عند درجة الصفر سيلزيوس فى المكتب الدولى للموازين والمقاييس بالقرب من باريس .

تمتاز سبيكة البلاتين الايريديوم عن المواد الأخرى مثل الزجاج بـ :

- ١- الصلابة .
- ٢- عدم التفاعل مع الوسط المحيط .
- ٣- لا تتأثر بتغير درجة الحرارة .

ثالثاً : معيار الزمن (الثانية)

— قديماً استخدم الليل والنهار واليوم للعثور على مقياس ثابت وسهل لوحدة الزمن (الثانية) حيث أن اليوم الشمسى المتوسط = 24 ساعة ، والساعة = 60 دقيقة ، والدقيقة = 60 ثانية
إذا : عدد ثوانى اليوم الشمسى المتوسط = $24 \times 60 \times 60 = 86400$ ثانية .

الثانية

تساوى عددياً $\frac{1}{86400}$ من اليوم الشمسى المتوسط

— حديثاً : استخدمت الساعات الذرية (مثل ساعة السيزيوم لمعايرة الثانية وذلك لدقتها المتناهية ، كما أنها تستخدم فى دراسة عدد كبير من المسائل ذات الأهمية العلمية والعملية مثل :
(١) تحديد مدة دوران الأرض حول نفسها (زمن اليوم) .
(٢) مراجعات لتحسين الملاحة الجوية والأرضية .
(٣) تدقيق رحلات سفن الفضاء لاكتشاف الكون .

تعريف آخر للثانية باستخدام السيزيوم

الثانية

الفترة الزمنية اللازمة لينبعث من ذرة السيزيوم ذو الكتلة الذرية 133 عدد من الموجات يساوى 9192631700 موجة

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|---------------------------------------|---|
| ١ | تعددت أدوات قياس الطول والكتلة والزمن | لتعدد الاستخدامات |
| ٢ | تفضل ساعة السيزيوم فى قياس الزمن | لأنها فى غاية الدقة حيث ان دقتها جزء من مائة ألف مليون جزء من الثانية . |

معادلة الأبعاد

هى صيغة تعبر عن معظم الكميات الفيزيائية المشتقة بدلالة أبعاد الكميات الفيزيائية الأساسية وهى الطول والكتلة والزمن مرفوع كل منها لأس معين ويكتب التعبير الناتج على الصورة الآتية : $[A] = M^{\pm a} \cdot L^{\pm b} \cdot T^{\pm c}$.

خطوات كتابة معادلة الأبعاد

- (١) كتابة العلاقة الرياضية التى تعبر عن الكمية الفيزيائية المطلوب تعيين معادلة أبعادها .
- (٢) كتابة العلاقة الرياضية بدلالة الكميات الفيزيائية الأساسية (M , L , T) الى الأس المناسب .
- (٣) رفع الرموز M , L , T الى الأس المناسب .
- (٤) فى حالة عدم وجود أى من الكميات الفيزيائية (الكتلة - الطول - الزمن) فى العلاقة يمثل بعدها بـ :
 M^0 أو L^0 أو T^0 حيث $X^0 = 1$ فلا تكتب .

| الكميات الفيزيائية | علاقتها مع الكميات الأخرى | معادلة الأبعاد | وحدة القياس |
|--------------------|---------------------------------------|--|---------------|
| المساحة (A) | الطول × العرض | $L \times L = L^2$ | m^2 |
| الحجم (V) | الطول × العرض × الارتفاع | $L \times L \times L = L^3$ | m^3 |
| الكثافة (ρ) | $\frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$ | $\frac{M}{L^3} = ML^{-3}$ | Kg/m^3 |
| السرعة (v) | $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$ | $\frac{L}{T} = LT^{-1}$ | m/s |
| العجلة (a) | $\frac{\text{السرعة}}{\text{الزمن}}$ | $\frac{LT^{-1}}{T} = LT^{-2}$ | m/s^2 |
| القوة (F) | الكتلة × العجلة | $M \times LT^{-2} = MLT^{-2}$ | N |
| الشغل (W) | القوة × الإزاحة | $M \times LT^{-2} \times L = ML^2T^{-2}$ | $Kg.m^2/s^2$ |
| الضغط (P) | $\frac{\text{القوة}}{\text{المساحة}}$ | $\frac{MLT^{-2}}{L^2} = ML^{-1}T^{-2}$ | N/m^2 |
| القدرة (P_w) | $\frac{\text{الشغل}}{\text{الزمن}}$ | $\frac{ML^2T^{-2}}{T} = ML^2T^{-3}$ | $J/s = W$ |
| التردد (ν) | $\frac{1}{\text{الزمن الدورى}}$ | $\frac{1}{T} = T^{-1}$ | $Hz = s^{-1}$ |

| الملاحظة | مثال |
|---|--|
| عند جمع أو طرح كميتين فيزيائيتين يجب أن تكونا من نفس النوع ولهما نفس معادلة الأبعاد ونفس وحدة القياس . | يمكن جمع كتلة 2kg مع كتلة 2kg ، ولا يمكن طرح كتلة 2kg مع مسافة 2m . |
| إذا كانت وحدة القياس مختلفة لكميتين من نفس النوع فيجب أن نحول وحدة قياس إحداهما الى وحدة قياس الأخرى لكي يمكن جمع أو طرح الكميتين مع بعضهما . | $1m + 170\text{ cm}$ $= 100\text{ cm} + 170\text{ cm}$ $= 270\text{ cm}$ |
| يمكن ضرب وقسمة الكميات الفيزيائية التى ليس لها نفس معادلة الأبعاد وفى هذه الحالة نحصل على كمية فيزيائية جديدة . | المسافة على الزمن تنتج السرعة |
| الثوابت العددية ليس لها وحدة قياس أو معادلة أبعاد . | $\pi - \frac{1}{4} - 5$ |
| الدوال المثلثية ليس لها وحدة قياس أو معادلة أبعاد . | $\sin - \cos - \tan$ |

أهمية معادلات الأبعاد

- ١) تستخدم فى اختبار صحة القوانين .
- ٢) أى : يجب أن يكون كل من طرفي المعادلة متماثلة وهو ما يسمى (تحقيق تجانس الأبعاد للمعادلة) .
- ٣) استنباط وحدة قياس أى كمية مشتقة .
- ٤) التأكد من إمكانية جمع أو طرح كميتين فيزيائيتين من أن لهما نفس معادلة الأبعاد .
- ٥) استنباط وحدة قياس ومعادلة الأبعاد لأى ثابت تناسب فيزيائى .

أمثلة محلولة

(١) اثبت صحة العلاقة : طاقة الحركة = $\frac{1}{2}$ الكتلة \times مربع السرعة ، إذا علمت أن معادلة أبعاد الطاقة هي :

$$E = ML^2T^{-2}$$

معادلة أبعاد الطرف الأيمن هي ML^2T^{-2}

الحل

معادلة أبعاد الطرف الأيسر هي $M \frac{L^2}{T^2} = ML^2T^{-2}$ (يلاحظ أن الكسر $\frac{1}{2}$ ليس له وحدة قياس) .

النتيجة : أبعاد طرفي المعادلة متطابقة . الاستنتاج : المعادلة صحيحة .

(٢) اقترح احد الأشخاص أن حجم الاسطوانة يتعين من العلاقة $(V = \pi r h)$ حيث (r) هي نصف القطر ، (h) ارتفاع الاسطوانة ، استخدم معادلة الأبعاد لكي تتحقق من صحة هذه المعادلة .

الحل

تكتب المعادلة $V = \pi r h$ (ويلاحظ أن π ثابت ليس له وحدات) .

معادلة أبعاد الطرف الأيسر (الحجم) L^3 .

معادلة أبعاد الطرف الأيمن هي (طول \times طول) L^2 .

النتيجة : أبعاد طرفي المعادلة غير متطابقة . الاستنتاج : المعادلة خطأ .

(٣) تخضع حركة جسم تحت تأثير الجاذبية الأرضية للعلاقة : $V_f = V_i + gt$ أثبت صحة هذه العلاقة باستخدام معادلات الأبعاد علماً بأن g هي عجلة الجاذبية الأرضية ، t الزمن ، V_f السرعة النهائية ، V_i السرعة الابتدائية .

الحل

معادلة أبعاد الطرف الأيسر (السرعة) LT^{-1} .

معادلة أبعاد الطرف الأيمن (سرعة + عجلة \times زمن) $T^{-1} = 2L$.

النتيجة : أبعاد طرفي المعادلة متطابقة . الاستنتاج : المعادلة صحيحة .

ملاحظات هامة

(١) اختلاف معادلة الأبعاد على طرفي المعادلة يؤكد خطأها .

(٢) وجود نفس معادلة الأبعاد على طرفي المعادلة لا يضمن صحتها

مثال : $KE = 3mv^2$ الطرفان لهما نفس معادلة الأبعاد ولكن الثابت 3 غير صحيح والصحيح $KE = \frac{1}{2}mv^2$

| م | علل لما يأتي | الإجابة |
|---|---|---|
| ١ | لا يمكن إضافة سرعة الى قوة | لأنه لا يمكن إضافة كمية فيزيائية الى أخرى الا إذا كان لها نفس معادلة الأبعاد والسرعة معادلة أبعادها LT^{-1} والقوة معادلة أبعادها MLT^{-2} |
| ٢ | أهمية دراسة معادلة الأبعاد لطرفي أى معادلة | للتحقق من صحة المعادلة من خلال تجانس أبعاد طرفي المعادلة . |
| ٣ | يكفى استخدام معادلة الأبعاد لإثبات خطأ القوانين ولا يكفى لإثبات صحتها . | لان عدم تطابق معادلة الأبعاد بين طرفي المعادلة يعنى أن المعادلة غير ممكنة فيزيائياً ويكون القانون خاطئ ، ولكن تطابقهما لا يعنى بالضرورة صحة القوانين فقد يحتوى القانون على ثابت عددي قيمته خاطئة تخل بصحة القانون |

مضاعفات وكسور الوحدات فى النظام العالمى

أ - فى عملية القياس توصف الكمية الفيزيائية بـ (رقم عددي - وحدة قياس) وقد تكون
 (١) كبيرة جداً : مثل المسافة بين النجوم كبيرة جداً وتقدر بحوالى (100,000,000,000,000,000 m) .
 (٢) صغيرة جداً : مثل المسافة بين الذرات فى الجوامد وتقدر بحوالى (0.000000001m) .
 ونظراً للصعوبة الكبيرة فى قراءة هذه الأرقام يفضل التعبير عنها وكتابتها باستخدام الرقم 10 مرفوعاً لأس معين وبهذه الطريقة تكتب:

(١) المسافة بين النجوم على الصورة ($1 \times 10^{17} m$) .

(٢) المسافة بين الذرات فى الجوامد على الصورة ($1 \times 10^{-9} m$)


ب - تسمى الطريقة السابقة فى التعبير عن الكميات الفيزيائية بـ (الصيغة المعيارية لكتابة الأعداد) .

جـ- سمي المعامل $10^{\pm x}$ بأسماء محددة تم الاتفاق عليها بين العلماء وهى موضحة بالجدول التالى :

| المعامل | 10^{-9} | 10^{-6} | 10^{-3} | 10^{-2} | 10^{-3} | 10^3 | 10^6 | 10^9 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| المسمى | نانو | ميكرو | مللى | سنتى | كيلو | ميغا | جيجا | |
| الرمز | n | μ | m | c | k | M | G | |

هى طريقة للتعبير عن الكميات العددية الكبيرة جداً أو الصغيرة جداً باستخدام الرقم 10 مرفوعاً لأس معين .

الصيغة المعيارية لكتابة الأعداد



أمثلة محلولة

(١) خزان يبلغ حجم الماء فيه ($9m^3$) أوجد حجم الماء بوحدة (cm^3) .

الحل

$$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m} \quad \text{بما أن :}$$

$$100 \text{ cm} = 1 \text{ m} \quad \text{بالضرب } 100 \times$$

$$9 \text{ m}^3 = 9 (100 \text{ cm})^3 = 9 \times 10^6 \text{ cm}^3 \quad \text{إذا :}$$

(٢) تيار كهربى شدته 7 مللى أمبير ($7mA$) ، عبر عن شدة هذا التيار بوحدة الميكروأمبير (μA) .

الحل

$$1mA = 10^{-3} A$$

$$1\mu A = 10^{-6} A$$

$$\frac{1mA}{1\mu A} = 10^3 \quad \text{بقسمة العلاقتين السابقتين ينتج أن :}$$

$$1mA = 10^3 \mu A$$

وبضرب الطرفين فى (7) نجد أن : $7 \text{ mA} = 7 \times 10^3 \mu A$
 معنى هذا أن : 7 مللى أمبير = 7000 ميكرو أمبير .

أنواع القياس

| وجه المقارنة | القياس المباشر | القياس غير المباشر |
|-------------------|--|--|
| عدد عمليات القياس | يتم فيه إجراء عملية قياس واحدة . | يتم فيه إجراء أكثر من عملية قياس . |
| عدد أدوات القياس | يتم فيه استخدام أداة قياس واحدة. | يتم فيه استخدام أكثر من أداة قياس . |
| العمليات الحسابية | لا يتم التعويض فى علاقة رياضية . | يتم التعويض فى علاقة رياضية لحساب الكمية |
| الأخطاء فى القياس | يكون هناك خطأ واحد فى عملية القياس | يكون هناك عدة أخطاء فى عملية القياس (فيحدث ما يعرف بتراكم الخطأ) . |
| أمثلة | ١ - قياس الحجم باستخدام المخبر المدرج. ٢ - قياس كثافة السائل باستخدام الهيدروميتر ، والذي ينتج عنه خطأ واحد فى القياس . | ١ - قياس الحجم بضرب الطول \times العرض \times الارتفاع . ٢ - قياس كثافة السائل عن طريق قياس الكتلة بالميزان وقياس الحجم بالمخبر المدرج ثم حساب الكثافة بقسمة الكتلة على الحجم ، والذي ينتج عنه خطأين فى القياس. |

خطأ القياس

دائماً يكون هناك اختلافاً بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية ويكون هذا الاختلاف طفيفاً أو كبيراً حسب دقة القياس .

لا يمكن أن تنتم عملية قياس بدقة 100%

علل

وذلك لعدة أسباب وهى :

| | | |
|-----|-----------------------------|--|
| (١) | اختيار أداة قياس غير مناسبة | كاستخدام الميزان المعتاد بدلاً من الميزان الحساس لقياس كتلة خاتم ذهبي |
| (٢) | وجود عيب فى أداة القياس | مثال عيوب جهاز الأميتر : (أ) قد يكون الجهاز قديماً والمغناطيس داخله أصبح ضعيفاً . (ب) خروج مؤشر المقياس عن صفر التدريج عند قطع التيار . |
| (٣) | إجراء القياس بطريقة خاطئة | قد تنتج أخطاء من الأشخاص المستجدين وغير المدربين على إجراء القياس بدقة مثل (أ) استخدام الأجهزة متعددة التدريج مثل المليمتر . (ب) النظر الى المؤشر أو التدريج بزاوية بدلاً من أن يكون خط الرؤية عمودياً على الأداة . |
| (٤) | عوامل بيئية | مثل : درجات الحرارة أو الرطوبة أو التيارات الهوائية |

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|---|--|
| ١ | يجب وضع الميزان الحساس داخل صندوق زجاجي | لان عند قياس كتلة جسم صغير باستخدامه تؤدي التيارات الهوائية الى حدوث خطأ فى عملية القياس . |
| ٢ | لا يصلم الميزان المعتاد لقياس كتلة صغيرة مثل خاتم ذهبي . | لان عند قياس كتلة جسم صغير باستخدامه تؤدي التيارات الهوائية الى حدوث خطأ فى عملية القياس . |
| ٣ | يفضل عند إجراء عملية القياس تكرار القياس عدة مرات وحساب المتوسط . | لتقليل مقدار الخطأ الذى قد يحدث أثناء القياس . |

| | |
|---|---|
| ٤ | عند قياس حجم سائل بواسطة المخبر المدرج يجب أن يكون خط الرؤية عمودى على تدريج المخبر . حتى يتم القياس بصورة دقيقة . |
|---|---|

| م | الأداة | احتياطات استخدامها |
|---|------------------------------------|--|
| ١ | المسطرة المترية فى قياس طول جسم ما | - عدم النظر الى التدريج بزاوية بل النظر بحيث يكون خط الرؤية عمودياً على التدريج . - أو يكون الطول المقاس مناسب لتدريج المسطرة فلا تستخدم مثلاً فى قياس أطوال صغيرة جداً . |
| ٢ | الأميتر لقياس شدة التيار | - التأكد من عدم ضعف المغناطيس الذى بداخل الأميتر . - وجود المؤشر فى البداية عند صفر التدريج . |
| ٣ | المخبر المدرج لقياس حجم سائل | - عدم النظر الى التدريج بزاوية بل النظر بحى يكون خط الرؤية عمودياً على التدريج . |
| ٤ | الميزان الحساس | - أن تكون كتلة الجسم صغيرة . - عدم وجوده فى تيارات هوائية . |

١- حساب الخطأ فى حالة القياس المباشر

| الخطأ النسبى (r) | الخطأ المطلق (Δ x) |
|--|--|
| هو النسبة بين الخطأ المطلق Δ x الى القيمة الحقيقية x_0 | هو الفرق بين القيمة الحقيقية (x_0) والقيمة المقاسة (x) |
| $r = \frac{\Delta x}{x_0}$ | $\Delta x = x_0 - x $ |
| ليس له وحدة قياس لأنه نسبة بين كميتين فيزيائيتين لهما نفس وحدة القياس | له وحدة قياس هى نفس وحدة قياس الكمية المقاسة |
| تدل علامة المقياس على أن الناتج يكون دائماً موجب حتى لو كانت الكمية الحقيقية أقل من الكمية المقاسة لان المهم هو معرفة مقدار الخطأ سواء كان بالزيادة أو النقصان . مثال : $ 8 = 8$, $ -8 = 8$ | |

(١) الخطأ النسبى أكثر دلالة على دقة القياس من الخطأ المطلق .
(٢) يكون القياس أكثر دقة كلما كان الخطأ النسبى صغيراً .

ملاحظات هامة

٢- حساب الخطأ فى حالة القياس غير المباشر

تختلف طريقة حساب الخطأ فى حالة القياس غير المباشر تبعاً للعلاقة الرياضية أثناء عملية الحساب كما يلى :

| العلاقة الرياضية | أمثلة | كيفية حساب الخطأ |
|------------------|--|---|
| الجمع | قياس حجم كميتين من سائل . $V = V_1 + V_2$ | الخطأ المطلق (Δ X) = الخطأ المطلق فى القياس الأول + الخطأ المطلق فى القياس الثانى . $\Delta X = \Delta X_1 + \Delta X_2$ |
| الطرح | قياس حجم قطعة نفوذ بطرح حجم الماء قبل وضعها فى مخبر مدرج من حجم الماء بعد وضعها فى المخبر . $V = V_1 - V_2$ | $\frac{\Delta x}{x_0} = \frac{\text{الخطأ المطلق}}{\text{القيمة الحقيقية}} = (r)$ الخطأ النسبى (r) |
| الضرب | قياس مساحة مستطيل بقياس الطول وقياس العرض وإيجاد حاصل ضربهما . | الخطأ النسبى = الخطأ النسبى فى القياس الأول + الخطأ النسبى فى القياس الثانى |
| القسمة | قياس كثافة سائل بقياس الكتلة والحجم ثم إيجاد ناتج قسمة الكتلة على الحجم | $r = r_1 + r_2$ الخطأ المطلق = الخطأ النسبى × القيمة الحقيقية |

أمثلة محلولة

(١) قام احد الطلاب بقياس طول قلم رصاص عملياً ووجد أنه يساوى (9.9 cm) وكانت القيمة الحقيقية لطول القلم تساوى (10 cm) بينما قام زميله بقياس طول الفصل ووجد أنه يساوى (9.13 m) فى حين أن القيمة الحقيقية لطول الفصل تساوى (9.11 m) احسب الخطأ المطلق والنسبى فى كل حالة .

الحل

فى حالة الطالب الأول : $\Delta x = |X_0 - X| = |10 - 9.9| = 0.1 \text{ cm}$ الخطأ المطلق

$$\text{الخطأ النسبى} \quad r = \frac{\Delta x}{x_0} = \frac{0.1}{10} = 0.01 = 1\%$$

فى حالة الطالب الثانى : $\Delta x = |X_0 - X| = |9.11 - 9.13| = |-0.02| \text{ m} = 2 \text{ cm}$

$$\text{الخطأ النسبى} \quad r = \frac{\Delta x}{x_0} = \frac{0.02}{9.11} = 0.0022 = 0.22\%$$

ويمكن التعبير عن نتيجة عملية القياس كالتالى :

(١) طول القلم الرصاص يساوى (10 ± 0.1) cm . (٢) طول الفصل يساوى (9.11 ± 0.02) m .

(٢) فى تجربة معملية لتعيين كمية فيزيائية (L) التى تتعين من جمع كميتين فيزيائيتين L_1, L_2 إذا كانت :

$$L_1 = (5.2 \pm 0.1) \text{ cm} \quad \text{و} \quad L_2 = (5.8 \pm 0.2) \text{ cm} \quad \text{أحسب قيمة } L ?$$

$$L_0 = (5.2 + 5.8) = 11 \text{ cm} \quad \text{القيمة الحقيقية لـ } (L)$$

$$\Delta L = (0.1 + 0.2) = 0.3 \text{ cm}$$

$$L = (11 \pm 0.3) \text{ cm}$$

الحل

(٣) قام طالب بقياس طول كتاب الفيزياء فوجد أنه 28.7cm وكانت القيمة الحقيقية هى 28 cm وقام طالب آخر بقياس طول الطاولة فكانت 3.95cm ولكن الطول الحقيقي لها 4m احسب أيهما كان أكثر دقة فى القياس .

الحل

فى حالة كتاب الفيزياء : $\Delta x = |X_0 - X| = |28 - 28.7| = 0.7 \text{ cm}$ الخطأ المطلق

$$\text{الخطأ النسبى} \quad r = \frac{\Delta x}{x_0} = \frac{0.7}{28} = 0.025 = 2.5\%$$

فى حالة كتاب الطاولة : $\Delta x = |X_0 - X| = |4 - 3.95| = 0.05 \text{ cm}$ الخطأ المطلق

$$\text{الخطأ النسبى} \quad r = \frac{\Delta x}{x_0} = \frac{0.05}{4} = 0.0125 = 1.25\%$$

قياس طول الطاولة أكثر دقة لان الخطأ النسبى اقل .

(٤) أحسب الخطأ النسبى والخطأ المطلق فى قياس مساحة مستطيل (A) طوله (6 ± 0.1) m وعرضه (5 ± 0.2) m .

الحل

$$\text{الخطأ النسبى فى قياس الطول} \quad r_1 = \frac{\Delta x}{x_0} = \frac{0.1}{6} = 0.017$$

$$\text{الخطأ النسبى فى قياس العرض} \quad r_2 = \frac{\Delta y}{y_0} = \frac{0.2}{5} = 0.04$$

$$\text{الخطأ النسبى فى قياس المساحة} \quad r = r_1 + r_2 = 0.017 + 0.04 = 0.057$$

$$\text{وبما أن : } r = \frac{\Delta A}{A_0} \quad \text{إذا : الخطأ المطلق} = \text{الخطأ النسبى} \times \text{المساحة الحقيقية}$$

$$\Delta A = r \times A_0 = (0.057) \times (5 \times 6) = 1.71 \text{ m}^2$$

$$\text{إذا : مساحة المستطيل : } A = (30 \pm 1.7) \text{ m}^2$$

(٥) أحسب الخطأ النسبى والخطأ المطلق فى قياس حجم متوازي مستطيلات إذا كانت نتائج قياس أبعاده على النحو التالى :

| البعد | الكمية المقاسة (cm) | الكمية الحقيقية (cm) |
|----------------|-----------------------|------------------------|
| الطول (x) | 4.3 | 4.4 |
| العرض (y) | 3.3 | 3.5 |
| الارتفاع (z) | 2.8 | 3 |

الحل

أولاً : حساب الخطأ النسبى :

الخطأ النسبى فى قياس الطول

$$r_1 = \frac{\Delta x}{x_0} = \frac{|4.4 - 4.3|}{4.4} = 0.023$$

الخطأ النسبى فى قياس العرض

$$r_2 = \frac{\Delta y}{y_0} = \frac{|3.5 - 3.3|}{3.5} = 0.057$$

الخطأ النسبى فى قياس الارتفاع

$$r_3 = \frac{\Delta z}{z_0} = \frac{|3 - 2.8|}{3} = 0.067$$

$$r = r_1 + r_2 + r_3 = 0.023 + 0.057 + 0.067 = 0.147$$

ثانياً : حساب الخطأ المطلق :

$$V_0 = X_0 Y_0 Z_0 = 4.3 \times 3.5 \times 3 = 46.2 \text{ cm}^3$$

$$\Delta V = 0.147 \times 46.2 = 6.79 \text{ cm}^3$$

وبما أن : $r = \frac{\Delta V}{V_0}$ $\Delta V = r V_0$

| م | ما معنى قولنا أن | الإجابة |
|---|---|--|
| ١ | الخطأ المطلق فى قياس طول الحائط = 10cm | أى أن الفرق بين القيمة الحقيقية لطول الحائط والقيمة المقاسة = 10 cm |
| ٢ | الخطأ النسبى فى قياس المسافة بين بيتين = 0.05 | أى أن النسبة بين الخطأ المطلق والقيمة الحقيقية للمسافة بين البيتتين = 0.05 |

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|--|---|
| ١ | قياس الكثافة بواسطة الهيدروميتر أدق من قياسها بواسطة الميزان والمخبار المدرج | لان استخدام الهيدروميتر لقياس كثافة سائل يعتبر قياس مباشر إما استخدام الميزان والمخبار المدرج قياس غير مباشر والقياس المباشر أدق من القياس غير المباشر . |
| ٢ | دقة القياس المباشر أكبر من دقة القياس غير المباشر . | لان الخطأ فى القياس غير المباشر يكون مركب من عدة أخطاء لذا يحدث ما يعرف بتراكم الخطأ ، أما فى القياس المباشر فهناك خطأ واحد فى عملية القياس . |
| ٣ | الخطأ النسبى هو الأكثر دلالة على دقة القياس من الخطأ المطلق | لان الخطأ النسبى يعطى النسبة بين الخطأ المطلق والقيمة الحقيقية للكمية المقاسة وليس قيمة الخطأ فقط . أو لان الخطأ النسبى يحسب الخطأ لكل وحدة بينما الخطأ المطلق يحسب الخطأ فى القياس ككل . |
| ٤ | قيمة الخطأ المطلق موجبة دائماً . | لان الخطأ المطلق يتعين من العلاقة $\Delta X = X_0 - X $ والمقياس دائماً يعطى قيمة موجبة حيث أن الهدف من حساب الخطأ المطلق هو معرفة مقدار الخطأ سواء بالزيادة أو النقصان . |
| ٥ | الخطأ النسبى ليس له وحدة قياس . | لأنه عبارة عن نسبة بين كميتين متماثلتين (من نوع واحد) |

الفصل الثانى

الكميات القياسية والكميات المتجهة

مقدمة

- (١) إذا ذكرنا أن جسمًا درجة حرارته (37°C) فهذه معلومة كاملة (درجة الحرارة كمية قياسية) .
- (٢) إذا ذكرنا أن سيارة تتحرك بسرعة (50 km/h) نكون ذكرنا المقدار ووحدة القياس ولكننا لم نذكر فى أى اتجاه تتحرك السيارة (شرقاً أم غرباً أم أى اتجاه) .
- (٣) يمكن كتابة سرعة السيارة بصورة كاملة (50 km/h) شرقاً (فنكون حددنا المقدار والاتجاه معاً ليكتمل المعنى (السرعة كمية متجهة) .

تصنيف الكميات الفيزيائية

| كمية متجهة | كمية قياسية |
|---|--|
| هى كمية فيزيائية تعرف تماماً بمقدارها واتجاهها معاً . | هى كمية فيزيائية تعرف تماماً بمقدارها فقط وليس لها اتجاه . |
| مثل : الإزاحة - السرعة - العجلة - القوة . | مثل : المسافة - الزمن - الكتلة - درجة الحرارة - الطاقة . |

| المسافة | الإزاحة |
|--|---|
| هى طول المسار المقطوع أثناء الحركة من موضع الى آخر . | هى المسافة المستقيمة فى اتجاه معين من نقطة بداية الى نقطة نهاية . |
| كمية قياسية يلزم معرفة مقدارها فقط . | كمية متجهة يلزم معرفة مقدارها واتجاهها معاً . |

ملاحظات هامة

- (١) يتساوى مقدار المسافة مع مقدار الإزاحة عندما يتحرك الجسم فى اتجاه ثابت (فى خط مستقيم) .
- (٢) تنعدم الإزاحة عندما تتطابق نقطة البداية مع نقطة النهاية (يعود الجسم الى نقطة البداية مرة أخرى) .

| م | ما معنى قولنا أن | الإجابة |
|---|--|--|
| ١ | المسافة التى يقطعها جسم $= 10\text{m}$ | أى أن طول المسار المقطوع أثناء حركة الجسم من موضع لآخر $10\text{m} =$ |
| ٢ | إزاحة سيارة $= 500\text{m}$ | أى أن المسافة المستقيمة التى تقطعها السيارة فى اتجاه معين من نقطة البداية الى نقطة النهاية $= 500\text{m}$. |
| ٣ | إزاحة جسم ما $= 0$ | أى أن الموضع النهائى للحركة هو نفس الموضع الابتدائى لها . |

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|--|---|
| ١ | تختلف الكميات الفيزيائية المتجهة عن الكميات القياسية | لان الكميات المتجهة يلزم تعريفها تعريفاً تاماً معرفة مقدارها واتجاهها بينما الكميات القياسية يلزم تعريفها معرفة مقدارها فقط . |
| ٢ | تعتبر المسافة كمية قياسية بينما الإزاحة كمية متجهة | لان المسافة تعرف بدلالة المقدار فقط أما الإزاحة فهى تعرف بدلالة المقدار والاتجاه . |

| م | متى يحدث الآتي | الإجابة |
|---|-------------------------|--|
| ١ | المسافة = الإزاحة | عندما يتحرك الجسم فى خط مستقيم (فى اتجاه ثابت) . |
| ٢ | الإزاحة = صفر | عندما تنطبق نقطة البداية على نقطة النهاية (يعود الجسم مرة أخرى الى نقطة البداية) . |
| ٣ | الإزاحة أقصر من المسافة | عندما يتحرك فى مسار منحنى . |

إرشادات لحل المسائل

- (١) لحساب المسافة (بغض النظر عن اتجاه حركة الجسم) نقوم بجمع جميع المسافات التى تحركها الجسم .
 (٢) لحساب الإزاحة
- إذا كانت الإزاحتين فى اتجاه واحد : فان الإزاحة المحصلة = مجموع الإزاحتين .
 - إذا كانت الإزاحتين فى اتجاهين متضادين : فان الإزاحة المحصلة = الفرق بين الإزاحتين .
 - إذا كانت الإزاحتين فى اتجاهين متعامدين : فان الإزاحة المحصلة = الجذر التربيعى لمجموع الإزاحتين .
- (٣) إذا تحرك الجسم فى مسار دائري وقطع :
- دورة كاملة : فان المسافة = $2\pi r$ ، الإزاحة = صفر . ($d = 0$, $s = 2\pi r$)
 - نصف الدورة : فان المسافة = πr ، الإزاحة = $2r$. ($d = 2r$, $s = \pi r$)
- *****

أمثلة محلولة

(١) تحرك عداء إزاحة مقدارها (50m) غرباً ثم تحرك فى عكس الاتجاه إزاحة مقدارها (30m) شرقاً ، أحسب المسافة والإزاحة التى قطعها هذا العداء .

الإزاحة فى اتجاه الغرب موجبة وفى اتجاه الشرق سالبة .

$$s = 50 + 30 = 80 \text{ m} \quad \text{المسافة المقطوعة}$$


$$d = +50 - 30 = +20 \text{ m} \quad \text{غرباً الإزاحة المقطوعة}$$

الحل

(٢) يتحرك رجل فى خط مستقيم من نقطة A الى نقطة B مسافة 12m ثم عاد من B الى A مرة أخرى ، اوجد المسافة والإزاحة .

$$d = 12 - 12 = 0 \quad , \quad s = 12 + 12 = 24 \text{ m}$$

الحل



(٣) مستطيل ABCD طوله 30cm وعرضه 40cm احسب كلاً من المسافة المقطوعة والإزاحة لجسم يتحرك فوقه عندما يتحرك الجسم :

(أ) من النقطة A الى النقطة B .

(ب) من النقطة A الى النقطة D مروراً بالنقطتين B, C .


(ج) من النقطة A ويمر بالنقاط B, C, D وينتهي عند نقطة A مرة أخرى .

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad d &= 30 \text{ cm} \quad , \quad s = 30 \text{ cm} \\ \text{(ب)} \quad d &= 40 \text{ cm} \quad , \quad s = 30 + 40 + 30 = 100 \text{ cm} \\ \text{(ج)} \quad d &= 0 \quad , \quad s = 30 + 40 + 30 + 40 = 140 \text{ cm} \end{aligned}$$

الحل

(٤) جسم يتحرك من نقطة A الى النقطة C مروراً بالنقطة B كما بالشكل ، أوجد المسافة والإزاحة .


الحل



$$s = 3 + 4 = 7m$$

$$d = \sqrt{(3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5m$$

(٥) تحركت سيارة على محيط دائرة من نقطة A الى نقطة B اوجد المسافة والإزاحة




الحل

$$s = 2 \pi r \div 2 = \pi r$$

$$d = r + r = 2r$$

(٦) تحرك أتوبيس على محيط دائرة قطرها 28m من نقطة C الى نقطة D ثم الى C مرة أخرى . أوجد المسافة المقطوعة والإزاحة الحادثة .



الحل

$$r = 28 \div 2 = 14 m$$

$$s = 2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 14 = 88m$$

$$d = 0$$

(٧) يتحرك جسم على محيط دائرة مركزها النقطة C (علماً بأن نصف قطرها 2 cm) من النقطة a الى النقطة b احسب الإزاحة التى يقطعها الجسم عندما يتحرك
(أ) نصف دورة (ب) ثلاثة ارباع دورة (ج) دورة كاملة


الحل

| الإزاحة | الشكل | |
|--|-------|-------|
| $d = 2r$ $= 2 \times 2 = 4 cm$ فى اتجاه ab | | (أ) |
| من نظرية فيثاغورث $d = \sqrt{(ca)^2 + (bc)^2}$ $d = \sqrt{(2)^2 + (2)^2} = 2\sqrt{2}cm$ فى اتجاه ab | | (ب) |
| $d = \text{zero}$ | | (ج) |

تمثيل الكميات المتجهة

تمثل الكمية المتجهة بقطعة مستقيمة موجهة (\rightarrow) بمقياس رسم مناسب قاعدتها عند نقطة البداية ورأسها عند نقطة النهاية بحيث يمثل :

- (١) طول القطعة المستقيمة الموجهة : مقدار الكمية المتجهة .
- (٢) اتجاه القطعة المستقيمة الموجهة : اتجاه الكمية المتجهة .
- (٣) يرمز للمتجه بحرف داكن (A) أو حرف عادى وفوقه سهم صغير (\vec{A}) .



بعض أساسيات جبر المتجهات


- (١) يتساوى المتجهان إذا كان لهما نفس المقدار ونفس الاتجاه (حتى لو اختلفت نقطة البداية لكل منهما) .
- (٢) لا يتساوى المتجهان إذا :
 - اختلفا فى الاتجاه (حتى وان اتفقا فى القيمة العددية) .
 - اختلفا فى المقدار (حتى وان اتفقا فى الاتجاه) .
- (٣) القيمة العددية للمتجه A تساوى القيمة العددية للمتجه $-A$ ولكن فى عكس اتجاهه .

ملاحظات هامة


- (١) إذا ضرب المتجه $-A$ $\times (-1)$ فإنه يساوى المتجه A مقداراً واتجاهاً .
- (٢) إذا ضرب المتجه A $\times (-1)$ ينعكس اتجاهه فقط .

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|--|--|
| ١ | قد يتساوى متجهين على الرغم من اختلاف نقطة بداية كل منهما | لان شرط تساوى متجهين أن يكون لهما نفس المقدار والاتجاه ولا يشترط ان يكون لهما نفس نقطة البداية . |
| ٢ | عدم تساوى متجهين على الرغم من اتفاقهما فى القيمة العددية ونقطة البداية | لعدم اتفاقهما فى الاتجاه . |

جبر المتجهات



اولا : محصلة جمع المتجهات



عندما تؤثر قوتان أو أكثر على جسم ما (كما بالشكل) فإن هذا الجسم يتحرك فى اتجاه معين تحده محصلة هذه القوى المؤثرة على الجسم والتي يطلق عليها القوة المحصلة (F) .

هى القوة الوحيدة التى تحدث فى الجسم الاثر نفسه الذى تحدثه القوى الاصلية المؤثرة عليه .

القوة المحصلة

ما معنى قولنا أن : محصلة قوتين = 20N

أى أن القوة الوحيدة التى تحدث فى الجسم الأثر نفسه الذى تحدثه قوتين محددين على الجسم = 20N .

عدم تغيير حالة الجسم على الرغم من تأثير ثلاث قوى عليه .

علل

لان الثلاث قوى تلاشى بعضهما البعض فتصبح القوة المحصلة المؤثرة على الجسم = صفر وبالتالي لا تتغير حالة الجسم .

| م | ماذا يحدث فى الحالات الآتية | الإجابة |
|---|---|---|
| ١ | أثرت قوتان متساويتان فى المقدار ومتضادتين فى الاتجاه على جسم ما . | لا تتغير حالة الجسم من سكون أو حركة لان كل منهما تلاشى الأخرى . |
| ٢ | أثرت ثلاث قوى مختلفة فى المقدار والاتجاه على جسم ساكن | يتحرك الجسم فى اتجاه القوة المحصلة المؤثرة عليه |


يتم جمع متجهين بطريقتين :

(١) رسم المثلث (طريقة الرأس وذيل) :

نقوم بتركيب المتجهات بحيث يقع ذيل المتجه الثانى على رأس المتجه الأول ثم نصل بين ذيل المتجه الأول ورأس المتجه الثانى ، فيكون المتجه الناتج هو المحصلة مقدارا واتجاهاً (كما فى الشكل b) .

(٢) رسم متوازى الأضلاع

يكون فيه A و B ضلعين متجاورين فيكون القطر ممثلاً لمحصلة المتجهين .
أى يرتبط ذيل المتجه الأول بذيل المتجه الثانى وعلى امتداد المتجهين نرسم متوازى أضلاع ويكون قطره من نقطه تلاقى ذيلى المتجهين هو محصلة جمع المتجهين (كما فى الشكل c) .




معلومات إضافية

١- جمع المتجهات المتعامدة

محصلة الجمع هى وتر المثلث القائم الزاوية وتحسب من قانون فيثاغورث

مثال : من الشكل المقابل يمكن حساب محصلة الجمع كما يلى :

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10N$$



٢- جمع المتجهات المتوازية

(١) إذا كان المتجهان فى نفس الاتجاه

$$\begin{array}{ccc} \vec{A} = 8 & \vec{B} = 6 & \\ \vec{A} + \vec{B} = 8 + 6 = 14 \end{array}$$

(٢) إذا كان المتجهان متعاكسان :

$$\begin{array}{ccc} \vec{A} = 8 & \vec{B} = 6 & \\ \vec{A} + (-\vec{B}) = 8 - 6 = 2 \end{array}$$

٣- طرح المتجهات

تجرى عملية الطرح بان نجمع المتجه الأول مع سالب المتجه الثانى بطريقة المثلث (الرأس والذيل) .

إرشادات لحل المسائل

(١) لإيجاد مقدار القوة المحصلة عند جمع متجهين و الزاوية بينهما :

- قائمة : يمكن استعمال نظرية فيثاغورث . $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$

- لا تساوى ٩٠ : يمكن استعمال قانون جيب التمام او قانون الجيب . $F = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB \cos \theta}$

$$\sin \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}, \quad \tan \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} \quad (٢)$$

| م | متى يحدث الآتي | الإجابة |
|---|--|--|
| ١ | المجموع الأتجاهى لعدة متجهات يساوى صفر | عندما تلاشى المتجهات بعضها . |
| ٢ | ناتج طرح متجهين يساوى صفر | عندما يتساويا فى القيمة العددية ويكون لهما نفس الاتجاه |
| ٣ | يتساوى متجهان | عندما يتساويا فى القيمة العددية ويكون لهما نفس الاتجاه |

أمثلة محلولة

(١) إزاحتان الأولى 25km والثانية 15km احسب مقدار محصلتهما عندما تكون الزاوية بينهما 90° وعندما تكون 135° .

$$d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2} = \sqrt{(25)^2 + (15)^2} = 29km$$

عندما تكون الزاوية بين المتجهين 90° :

$$d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 - 2d_1d_2 \cos \theta}$$

عندما تكون الزاوية بين المتجهين 135° :


$$= \sqrt{(25)^2 + (15)^2 - 2(25)(15)\cos(135)} = 37km$$

الحل

(٢) اوجد محصلة قوتين إحداها فى اتجاه محور (x) وهى $F_x = 4N$ ، والأخرى فى اتجاه محور (y) وهى $F_y = 3N$

الحل

- نكمل متوازي الأضلاع فنحصل على مستطيل (لان القوتين متعامدتين) .
- نصل القطر فيمثل المحصلة F .
- بتطبيق نظرية فيثاغورث يمكن إيجاد القيمة العددية لمحصلة القوى F كما يلي :




$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5N$$

$$\tan \theta = \frac{F_y}{F_x} = \frac{3}{4} \quad \theta = 36.87^\circ$$

(٣) سفينة تمر فى اتجاه الشمال بسرعة $12km/h$ لكنها تنحرف نحو الغرب بتأثير المد والجزر بسرعة قدرها $15km/h$ ، احسب مقدار واتجاه السرعة المحصلة للسفينة.

الحل




$$V = \sqrt{V_1^2 + V_2^2} = \sqrt{(12)^2 + (15)^2} = 19.2km/h$$

السرعة المحصلة فى اتجاه الشمال الغربى .

(٤) تتحرك عربة قاطعة إزاحة مقدارها $20km$ باتجاه الشمال ثم إزاحة مقدارها $35km$ بزاوية 60° باتجاه شمال غرب اوجد قيمة الإزاحة المحصلة للعربة .

الحل

من الرسم



$$\theta = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

$$d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 - 2d_1d_2 \cos \theta}$$


$$= \sqrt{(20)^2 + (35)^2 - 2(20)(35) \cos(135)} = 48.2km$$

(٥) إذا كانت محصلة قوتين F_x ، F_y وهى $F = 28.3 N$ وتصنع زاوية 47.86° مع اتجاه F_x فأوجد F_x عندما تكون $F_y = 21 N$.

الحل

$$F_x = \frac{F_y}{\tan \theta} = \frac{21}{\tan 47.86^\circ} = 19N$$

ثانيا : تحليل المتجه



- هو العملية العكسية لجمع المتجهات .
- يمكن تحليل القوة F الى قوتين متعامدين على محورى (x , y) كالتالى :

$$F_x = F \cos \theta \quad , \quad F_y = F \sin \theta$$

مثال :

طفلة تجر أخرى بقوة 20N بواسطة حبل فى اتجاه يصنع زاوية 30° مع الأفقى احسب قيمة القوة فى اتجاهي x , y .

الحل

$$F_x = F \cos \theta = 20 \times \cos 30^\circ = 17.3 \text{ N}$$

$$F_y = F \sin \theta = 20 \sin 30^\circ = 10 \text{ N}$$

ثالثا : ضرب المتجهات

توجد صور مختلفة لضرب المتجهات منها ، الضرب القياسي والضرب الاتجاهي:

(١) الضرب القياسي :

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| | هو حاصل ضرب القيمة العددية للمتجه الأول فى القيمة العددية للمتجه الثانى فى جيب تمام الزاوية بينهما. | تعريفه |
| | $\vec{A} \cdot \vec{B} = A B \cos \theta$ <p>وتسمى النقطة بين المتجهين dot</p> | قانونه |
| | كمية قياسية لان حاصل ضرب (كمية قياسية × كمية قياسية) = كمية قياسية . | الكمية الناتجة عنه |
| | موجبة : إذا كانت الزاوية المحصورة بين المتجهين بين 0 و 90°، وتكون أقصى قيمة عند 0° درجة . | تكون نتيجة الضرب القياسى لمتجهين |
| | سالبة : إذا كانت الزاوية المحصورة بين المتجهين بين 90° و 180° درجة . | |
| | صفر : ١- إذا كانت الزاوية بين المتجهين 90° (أحد المتجهين عمودي على الآخر) ٢- عندما يساوى احدهما صفر . | |

ما معنى قولنا أن : حاصل الضرب القياسى لمتجهين = 12.3

أى أن حاصل ضرب القيمة العددية للمتجه الأول فى القيمة العددية للمتجه الثانى فى جيب تمام الزاوية بينهما = 12.3


متى يكون : حاصل الضرب القياسى لمتجهين يساوى صفر

عندما يكون المتجهان متعامدان

(٢) الضرب الاتجاهى

تعريفه هو حاصل ضرب القيمة العددية للمتجه الأول فى القيمة العددية للمتجه الثانى فى جيب الزاوية بينهما فى متجه الوحدة العمودي على المستوى الذى يوجد فيه المتجهان .

$$\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B} = A B \sin \theta \vec{n}$$

قانونه

$$(١) \theta \text{ تقع بين } \vec{A} \text{ و } \vec{B}$$

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = -\vec{B} \wedge \vec{A} \quad (٢)$$

$$\vec{A} \wedge \vec{B} \neq \vec{B} \wedge \vec{A} \quad (٣)$$

(٤) أقصى قيمة عند 90° (٥) يساوى صفر عند 0° **فى حالة الضرب
الاتجاهى يكون :**




- (١) المتجه \vec{C} الناتج يكون فى اتجاه \vec{n} العمودي على المستوى الذى يجمع \vec{A} و \vec{B} .
 (٢) تسمى (\wedge) العلامة بين المتجهين Cross .
 (٣) يحدد اتجاه \vec{C} بقاعدة تسمى (قاعدة اليد اليمنى) .

ملاحظات هامة**قاعدة اليد اليمنى****الاستخدام :**

تحديد اتجاه محصلة الضرب الاتجاهى لمتجهين .

الطريقة :

بتحريك أصابع اليد اليمنى من المتجه الأول نحو المتجه الثانى عبر الزاوية الأصغر بينهما فيكون الإبهام مشيراً لاتجاه حاصل الضرب الاتجاهى لهما .

**ما معنى قولنا أن : حاصل الضرب الاتجاهى لمتجهين $\vec{n} = 38.5$**

أى أن حاصل ضرب القيمة العددية للمتجه الأول فى القيمة العددية للمتجه الثانى فى جيب الزاوية بينهما فى متجه الوحدة العمودي على المستوى الذى يوجد فيه المتجهان $\vec{n} = 38.5$

متى يكون القيمة العددية للضرب الاتجاهى لمتجهين يساوى القيمة العددية للضرب القياسى لهما على الرغم من وجود زاوية بينهما .

عندما تكون الزاوية بين المتجهين $= 90^\circ$

مثال

$$A = 5$$

$$B = 10$$

إذا كانت القيمة العددية للمتجهين \vec{A} و \vec{B} هي:

$$\vec{A} \wedge \vec{B} \text{ : ثانياً}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} \text{ : أولاً}$$

أوجد قيمة كل من:

علماً بأن الزاوية بينهما تساوى 60°

$$\cos 60 = 0.5$$

$$\sin 60 = 0.866$$

الحل:

أولاً:

$$\therefore \vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

$$\therefore \vec{A} \cdot \vec{B} = 5 \times 10 \times 0.5 = 25$$

ثانياً:

$$\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B} = AB \sin \theta \vec{n} = (5 \times 10 \times 0.866) \vec{n}$$

$$\vec{C} = 43.3 \vec{n}$$

حيث \vec{C} متجة القيمة العددية تساوى 43.3 فى الاتجاه \vec{n} العمودى على المستوى الذى يشمل المتجهان \vec{A} و \vec{B}

أسئلة الفصل الأول

الاسئلة التى بها العلامة :

(✍) وردت فى امتحانات فى الأعوام السابقة على مستوى الجمهورية .

(📖) وردت فى الكتاب المدرسى .

س ١ : اكتب المصطلح العلمى لكل من

- ١- ✍ عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى من نفس نوعها لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الثانية .
- ٢- ✍ كمية فيزيائية تعرف بدلالة الكميات الفيزيائية الأساسية .
- ٣- ✍ المسافة بين علامتين محفورتين عند نهايتى ساق من سبيكة البلاتين - الايريديوم محفوظة عند درجة الصفر سيلزيوس فى المكتب الدولى للموازن والمقاييس بالقرب من باريس .
- ٤- ✍ صيغة رمزية تعبر عن الكميات الفيزيائية المشتقة بدلالة أبعاد الكميات الفيزيائية الأساسية وهى الطول والكتلة والزمن مرفوع كل منها لأس معين .
- ٥- ✍ القياس الذى يتم فيه استخدام أداة قياس واحدة .
- ٦- ✍ القياس الذى يتم فيه استخدام أكثر من أداة للقياس .
- ٧- ✍ الفرق بين القيمة الحقيقية للكمية المقاسة والقيمة المقاسة فعلياً .
- ٨- ✍ النسبة بين الخطأ المطلق الى القيمة الحقيقية للكمية المقاسة .
- ٩- ✍ تحول مشاهدتنا الى مقادير كمية يمكن التعبير عنها بواسطة الأرقام .
- ١٠- ✍ كمية فيزيائية لا تعرف بدلالة كمية فيزيائية أخرى .
- ١١- ✍ نظام الوحدات الذى يستخدم القدم كوحدة أساسية للطول .
- ١٢- ✍ نظام الوحدات الذى يستخدم الجرام كوحدة أساسية للكتلة .
- ١٣- ✍ نظام الوحدات الذى يستخدم المتر كوحدة أساسية للطول .
- ١٤- ✍ وحدة قياس شدة التيار فى النظام الدولى (SI) .
- ١٥- ✍ وحدة قياس الزاوية المجسمة فى النظام الدولى (SI) .
- ١٦- ✍ كتلة اسطوانة من سبيكة البلاتين - الايريديوم ذات أبعاد محددة محفوظة عند درجة الصفر سيلزيوس فى المكتب الدولى للموازن والمقاييس بالقرب من باريس .
- ١٧- ✍ صورة مختصرة لتوصيف فيزيائى ذات مدلول معين .
- ١٨- ✍ نظام يسمى النظام المترى المعاصر .
- ١٩- ✍ نظام يستخدم فى جميع المجالات العلمية المختلفة فى العالم .
- ٢٠- ✍ عالم بريطاني وهو ابرز العلماء الذين طوروا النظام المترى .
- ٢١- ✍ قام بتعيين درجة الصفر المطلق على مقياس كلفن لدرجات الحرارة بدقة تامة ووجد أنها تساوى -273°C .
- ٢٢- ✍ عالم مصري استخدم الليزر فى دراسة التفاعلات الكيميائية بين الجزيئات والتي تحدث فى فترة زمنية تقاس بالفيمتو ثانية .
- ٢٣- ✍ أجزاء من جسم الإنسان اتخذها فى الماضى كمقاييس للطول .
- ٢٤- ✍ استفاد منها الإنسان فى الماضى واتخذها كمقاييس للزمن .
- ٢٥- ✍ احد العوامل البيئية التى تؤدى الى حدوث خطأ فى عملية قياس كتلة جسم صغير باستخدام ميزان حساس .
- ٢٦- ✍ القياس الذى يتم فيه التعويض فى علاقة رياضية لحساب الكمية الفيزيائية .
- ٢٧- ✍ القياس الذى لا يتم فيه التعويض فى علاقة رياضية لحساب الكمية الفيزيائية .
- ٢٨- ✍ قياس الحجم باستخدام المخبر المدرج .

- ٢٩- قياس الحجم بضرب الطول \times العرض \times الارتفاع .
 ٣٠- قياس كثافة السائل عن طريق قياس الكتلة بالميزان وقياس الحجم بالمخبار المدرج ثم حساب الكثافة بقسمة الكتلة على الحجم .
 ٣١- قياس كثافة السائل باستخدام الهيدروميتر .
 ٣٢- طريقة التعبير عن الكميات العددية الكبيرة جداً أو الصغيرة جداً وكتابتها باستخدام الرقم 10 مرفوعاً لأس معين.

س ٢ : اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة

- ١- من الكميات الفيزيائية المشتقة
 ٢- فى النظام الدولى يتخذ الأمبير وحدة أساسية لقياس
 ٣- معادلة أبعاد العجلة
 ٤- الوحدة الأساسية لقياس درجة الحرارة فى النظام الدولى هى (السيلزيوس- الفهرنهايت- الكلفن - الدرجة المئوية)
 ٥- الاستريديان هى وحدة قياس فى النظام الدولى
 ٦- الكانديلا هى وحدة قياس فى النظام الدولى (شدة الإضاءة - الزاوية المجسمة - درجة الحرارة - كمية المادة)
 ٧- من الكميات الفيزيائية الأساسية
 ٨- وحدة قياس الكتلة فى النظام البريطانى
 ٩- تستخدم القدم ذات الورانية فى قياس
 ١٠- إذا كانت وحدة قياس احد الكميات الفيزيائية هى $kg/m.s^2$ فان معادلة أبعادها $(MLT^{-2} - ML^{-1}T^{-2} - MLT - ML^{-1}T^{-2})$
 ١١- الميكروجرام يساوى كيلوجرام.
 ١٢- شدة تيار تقدر بـ 1mA فإنها تساوى μA
 ١٣- أفضل الطرق للتعبير عن مدى دقة القياس
 ١٤- من العناصر الرئيسية فى عملية القياس
 ١٥- يتفق النظام الفرنسى (نظام جاوس) والنظام البريطانى والنظام المترى فى أن جميعهم يقيس
 ١٦- السبيكة التى استخدمت لصناعة الكيلو جرام العيارى هى سبيكة
 ١٧- وحدة قياس الطول فى نظام جاوس
 ١٨- عدد الوحدات الأساسية والمضافة إليها فى النظام الدولى
 ١٩- وحدة قياس كمية المادة فى النظام الدولى
 ٢٠- من الوحدات الفيزيائية الى لا تشتق بدلالة وحدات أخرى
 ٢١- الكميات التالية أساسية ماعدا كمية واحدة مشتقة
 ٢٢- اتخذ الإنسان فى الماضى كمقاييس للزمن (شروق الشمس - غروب الشمس - دورة القمر - جميع ما سبق)
 ٢٣- اتخذ الإنسان فى الماضى كمقاييس للطول (الذراع - كف اليد - القدم - جميع ما سبق)
 ٢٤- وحدة قياس القوة فى النظام الدولى (SI) هى النيوتن
 ٢٥- وحدة قياس الشغل فى النظام الدولى (SI) هى
 ٢٦- إذا كانت معادلة أبعاد احد الكميات الفيزيائية هى $M^0 L^0 T^{-1}$ فان وحدة قياس هذه الكمية
 ٢٧- معادلة أبعاد الكتلة فى النظام الدولى
 ٢٨- إذا كانت $x=yz$ ومعادلة أبعاد x هى MLT^{-2} ومعادلة أبعاد y هى $M^0 L T^{-2}$ فإن معادلة أبعاد z هى
 ٢٩- معادلة أبعاد المساحة

- ٣٠- 0.001 يمكن كتابتها على الصورة
- ٣١- المقدار 10^4 يساوى
- ٣٢- خارج قسمة 10^4 على 10^6 يساوى
- ٣٣- الميكرومتر يساوى m
- ٣٤- يحتوى الكيلوجرام على..... جرام .
- ٣٥- المتر يساوى سنتيمتر .
- ٣٦- يوجد فى السنتيمتر ملليمتر .
- ٣٧- 10^{-3} من المتر يسمى
- ٣٨- 0.1mg يساوى ($10^{-3} g - 10^{-6} g - 10^{-4} kg - 10^{-7} kg$) .
- ٣٩- من أهم أسباب الخطأ فى القياس
- (العوامل البيئية - إجراء القياس بطريقة خاطئة - وجود عيب فى أداة القياس - جميع ما سبق)
- ٤٠- لقياس كثافة سائل بصورة مباشرة يستخدم (المسطرة - الميكرومتر - الهيدرومتر - المخبر المدرج)
- ٤١- قياس حجم سائل باستخدام المخبر المدرج من أنواع القياس (المركب - المعقد - المباشر - الغير مباشر)
- ٤٢- من أمثلة القياس غير المباشر
- قياس مساحة المستطيل بالمسطرة .
- قياس كثافة سائل بالهيدرومتر .
- ٤٣- عند جمع أو طرح كميتين فيزيائيتين يجب أن يكون لهما نفس
- (النوع - معادلة الأبعاد - وحدة القياس - جميع ما سبق)
- ٤٤- الصورة العامة لمعادلة الأبعاد هى ($L^{\pm a} M^{\pm b} T^{\pm c} - L^{\pm a} M^{\pm b} T^{\pm c} - L^{\pm a} M^{\pm b} T^{\pm c} - L^{\pm a} M^{\pm b} T^{\pm c}$)
- ٤٥- نحصل على كمية فيزيائية جديدة عند
- جمع كميات فيزيائية لها نفس معادلة الأبعاد .
- ضرب كميات فيزيائية ليس لها نفس معادلة الأبعاد .
- ٤٦- الثوابت العددية والدوال المثلية
- (لها وحدة قياس - لها معادلة أبعاد - لها وحدة قياس ومعادلة أبعاد - ليس لها وحدة قياس أو معادلة أبعاد)
- ٤٧- وجود نفس معادلة الأبعاد على طرفي المعادلة
- (يؤكد صحتها - يؤكد خطأها - لا يضمن صحتها - يضمن صحتها)
- ٤٨- فى عملية القياس توصف الكمية الفيزيائية بـ
- (رقم عددي - وحدة قياس - رقم عددي ووحدة قياس - لا توجد إجابة صحيحة)
- ٤٩- لقياس الكمية الفيزيائية بدقة يجب أن يكون خط الرؤية الأداة .
- (موازياً - عمودي على - أعلى - أسفل)
- ٥٠- تدل علامة المقياس | | على أن الناتج يكون دائماً (موجب - سالب - موجب وسالب - صفر)

س ٣ : ما المقصود بكل من

- ١- معيار الكتلة .
- ٢- القياس .
- ٣- المتر العيارى .
- ٤- الكيلوجرام العيارى .
- ٥- الكميات الفيزيائية الأساسية .
- ٦- الكميات الفيزيائية المشتقة .
- ٧- المعادلة الفيزيائية الرياضية .
- ٨- الصيغة المعيارية لكتابة الأعداد .
- ٩- معادلة الأبعاد .
- ١٠- القياس المباشر .
- ١١- القياس غير المباشر .
- ١٢- الخطأ المطلق .
- ١٣- الخطأ النسبى .
- ١٤- الثانية .

س ٤ : ما معنى قولنا أن :

- ١- الخطأ المطلق فى قياس المسافة بين مبنيين = 0.2m .
- ٢- الخطأ النسبى فى قياس طول ملعب = 0.03 .
- ٣- الزمن كمية أساسية - العجلة كمية مشتقة .

س ٥ : علل لما يأتى :

- ١- لا يستخدم ساق من الزجاج بدلاً من سبيكة البلاتين - ايريديوم فى المتر العيارى .
- ٢- لا يمكن أن تتم عملية قياس بدقة 100% .
- ٣- يوضع الميزان الحساس داخل صندوق زجاجي .
- ٤- تعتبر الكتلة من الكميات الفيزيائية الأساسية .
- ٥- تعتبر السرعة من الكميات الفيزيائية المشتقة .
- ٦- لا تكفى الأرقام للتعبير عن الكميات الفيزيائية .
- ٧- اهتمام العلماء بتطوير الساعات الذرية ذات الدقة المتناهية .
- ٨- أهمية القياسات فى الحياة اليومية .
- ٩- أدوات القياس الحديثة ذات أهمية للإنسان .
- ١٠- تغير تعريف المتر أكثر من مرة .
- ١١- لا يمكن إضافة سرعة الى قوة .
- ١٢- أهمية دراسة معادلة الأبعاد لطرفي أى معادلة فيزيائية .
- ١٣- يكفى استخدام معادلة لطرفي أى معادلة فيزيائية .
- ١٤- اهتم الإنسان عبر تاريخه بتحسين وتطوير أجهزته .
- ١٥- لا يصلح الميزان المعتاد لقياس كتلة صغيرة مثل خاتم ذهبي .
- ١٦- قياس الكثافة بواسطة الهيدروميتر أدق من قياسها بواسطة الميزان والمخبار المدرج .
- ١٧- دقة القياس المباشر اكبر من دقة القياس غير المباشر .
- ١٨- الخطأ النسبى هو الأكثر دلالة على دقة القياس من الخطأ المطلق .
- ١٩- عند قياس حجم سائل بواسطة المخبار المدرج يجب أن يكون خط الرؤية عمودي على تدريج المخبار .
- ٢٠- قد يوجد عيب أو أكثر فى جهاز الأميتر .
- ٢١- يفضل عند إجراء عملية القياس تكرار القياس عدة مرات وحساب المتوسط .
- ٢٢- قيمة الخطأ المطلق موجبة دائماً .
- ٢٣- الخطأ النسبى ليس له وحدة قياس .

س ٦ : قارن بين كل من :

- ١- الكميات الفيزيائية الأساسية والكميات الفيزيائية المشتقة (من حيث : التعريف - الأمثلة) .
- ٢- القياس المباشر والقياس غير المباشر (من حيث : عدد عمليات القياس - العمليات الحسابية - أخطاء القياس - مثال) .
- ٣- النظام الفرنسى والنظام البريطانى والنظام المترى (من حيث وحدة القياس : الطول - الكتلة - الزمن) .
- ٤- ساق من الزجاج وسبيكة من البلاتين - الايريديوم (من حيث الاستخدام فى صناعة المتر العيارى) .
- ٥- أهم أعمال وليام طومسون وأهم أعمال احمد زويل .
- ٦- أدوات القياس قديماً وأدوات القياس حديثاً .
- ٧- المتر العيارى والكيلوجرام العيارى .
- ٨- الراديان الاستريديان .
- ٩- الخطأ المطلق والخطأ النسبى .
- ١٠- القوة والشغل (من حيث : وحدة القياس - معادلة الأبعاد) .
- ١١- المسطرة المترية والمخبار المدرج .

س ٦ : اذكر استخداما واحدا لكل من :

- ١- ساعة السيزيوم الذرية .
- ٢- القدمة ذات الورانية .
- ٣- سبيكة البلاتين - الايريديوم .
- ٤- معادلة الأبعاد .
- ٥- الهيدروميتر .
- ٦- الميزان الحساس .
- ٧- الميكرومتر .
- ٨- الشريط المترى .
- ٩- الميزان الروماني .
- ١٠- الساعة الرقمية .
- ١١- المخبار المدرج .
- ١٢- الأميتر .

س ٧ : صنف الكميات الفيزيائية الآتية الى كميات أساسية وأخرى مشتقة :

القوة — المسافة — السرعة — الكتلة — الزمن — العجلة — درجة الحرارة المطلقة — شدة الإضاءة — كمية المادة — شدة التيار الكهربى — الطول .

س ٨ : اكتب وحدات قياس الكميات الفيزيائية الآتية :

القوة — المسافة — السرعة — الكتلة — الزمن — العجلة — درجة الحرارة المطلقة — شدة الإضاءة — كمية المادة — شدة التيار الكهربى — الطول — شدة التيار الكهربى — المساحة — الحجم — القوة — الشغل — الضغط — القدرة — التردد .

س ٩ : اذكر الكميات الفيزيائية التى تقاس بالوحدات الآتية :

المتر (m) - الكيلوجرام (kg) - الثانية (s) - الأمبير (A) - الكلفن (K) - المول (mol) - الكانديلا (cd) - الجول (J) - النيوتن (N) - الاستريديان - m/s - m/s² - kg.m²/s² - J/s .

س ١٠ : اكتب القراءات التالية مستخدما الصيغة المعيارية فى كتابة الأعداد :

- ١ - كتلة الفيل = 4000kg =
- ٢ - 1mg = kg =
- ٣ - 88 km = m =
- ٤ - نصف قطر الكرة الأرضية = 6000000m =
- ٥ - 3 × 10⁹ s = ms =
- ٦ - قطر شعرة رأس الإنسان = 0.05 mm = m =
- ٧ - سرعة الضوء = 300000000 m/s =
- ٨ - نصف قطر ذرة الهيدروجين = 0.0000000005m =
- ٩ - طول الشجرة = 20m =
- ١٠ - عدد الثواني فى اليوم = 86400s =
- ١١ - قوة الدفع المؤثر على جسم = 50000N =
- ١٢ - الشغل الذى تبذله اله = 74000J =
- ١٣ - كتلة النمل = 0.0001kg =
- ١٤ - كثافة الذهب = 19300 kg/m³ =

س ١١ : اختبر صحة القوانين الآتية:

- ١ - الشغل = 1/2 mv²
 - ٢ - القوة = m/a
 - ٣ - مساحة المربع = L²
 - ٤ - v = t a²
- حيث (m) كتلة الجسم ، (v) سرعة الجسم ، (a) عجلة حركة الجسم ، (L) طول ضلع المربع ، (t) الزمن .

س ١٢ : اذكر الاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام :

- ١ - المسطرة المترية فى قياس طول جسم ما .
- ٢ - الأميتر لقياس شدة التيار .
- ٣ - المخبر المدرج لقياس حجم سائل .
- ٤ - الميزان الحساس .

س ١٣ : أسئلة متنوعة :

- ١- ما أسباب الخطأ فى القياس .
- ٢- استنتج معادلة أبعاد الضغط إذا كان (الضغط = القوة ÷ المساحة) .
- ٣- فى امتحان مادة الفيزياء كتب طالب المعادلة التالية :
(السرعة بوحدة m/s = العجلة بوحدة m/s² × الزمن بوحدة s)
- ٤- وضع اينشتين معادلته الشهيرة $E = mc^2$ حيث (c) سرعة الضوء ، (m) الكتلة ، استخدم هذه المعادلة لاستنتاج وحدات النظام الدولى SI للمقدار (E) .
- ٥- ما المقصود بالقياس ؟ وما العناصر الرئيسية له ؟
- ٦- (لا تكفى الأرقام للتعبير عن الكميات الفيزيائية) وضح تلك العبارة ، مع ذكر أمثلة .
- ٧- مستعيناً بمعادلة الأبعاد للكميات الفيزيائية ، أثبت صحة العلاقة : $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$
حيث (N) قوة الشد ، μ كتلة وحدة الأطوال (kg/m) ، v السرعة (m/s) .

س ١٤ : ١- مسائل من الكتاب المدرسى

- (١) نصف قطر كوكب زحل يساوى $5.85 \times 10^7 m$ وكتلته 5.86×10^{26} احسب :
(أ) متوسط كثافة مادة الكوكب بوحدة g/cm³
(ب) مساحة سطح الكوكب بوحدة m² . (مساحة السطح $4\pi r^2$) .
[0.677 g/cm^3 , $4.3 \times 10^{16} \text{ m}^2$]
- (٢) إذا كان $x = (5 \pm 0.1) \text{ cm}$ ، $y = (10 \pm 0.2) \text{ cm}$ ، احسب كل من :
(أ) $x + y$ (ب) $2x + y$ (ج) xy (د) xy^2
[$(15 \pm 0.3) \text{ cm}$, $(20 \pm 0.4) \text{ cm}$, $(50 \pm 2) \text{ cm}^2$, $(500 \pm 30) \text{ cm}^3$]
- (٣) مكعب طول ضلعه 5cm اوجد الخطأ النسبى فى تقدير حجمه إذا علمت أن الخطأ النسبى فى تقدير الطول كان 0.01 ، واوجد أيضاً قيمة الخطأ المطلق فى هذه الحالة .
[0.03 , 3.75 cm^3]
- (٤) جسم كتلته $(4.5 \pm 0.1) \text{ kg}$ ويتحرك بسرعة $(20 \pm 1) \text{ m/s}$ ، احسب الخطأ النسبى والخطأ المطلق فى قياس كمية تحرك الجسم P_L (كمية التحرك = الكتلة × السرعة) .
[0.072 , 6.48 kg.m/s]

س ١٤ : ٢- مسائل امتحانات

- (٥) قام احد الطلاب بقياس طول باب الفصل ووجد انه يساوى 250cm وكانت القيمة الحقيقية هى 255cm ، احسب الخطأ المطلق والنسبى لهذا القياس .
[5 cm , 1.96%]
- (٦) عند قياس السرعة المنتظمة لجسم كانت المسافة $(40 \pm 2) \text{ m}$ ، والزمن $(5 \pm 1) \text{ s}$ ، احسب الخطأ المطلق فى قياس السرعة .
[2 m/s]
- (٧) احسب الخطأ النسبى فى قياس مساحة مستطيل (A) طوله $(6 \pm 0.1) \text{ m}$ ، وعرضه $(5 \pm 0.2) \text{ m}$.
- (٨) احسب الخطأ النسبى فى قياس مساحة اسطوانة معدنية إذا كانت نتائج القياس على النحو التالى :

| البعد | الكمية المقاسة (cm) | الكمية الحقيقية (cm) |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| الارتفاع (h) | 8.6 | 8.8 |
| نصف القطر (r) | 2.8 | 3 |

أسئلة الفصل الثانى

س ١ : اكتب المصطلح العلمى لكل من :

- (١) قوة وحيدة تحدث فى الجسم الأثر نفسه الذى تحدثه القوى الأصلية المؤثرة عليه .
- (٢) كمية فيزيائية تعرف تماماً بمقدارها فقط .
- (٣) كمية فيزيائية تعرف تماماً بمقدارها واتجاهها معاً .
- (٤) قاعدة تستخدم لتحديد اتجاه محصلة الضرب الاتجاهى لمتجهين .
- (٥) اقصر مسافة مستقيمة مباشرة بين نقطة البداية ونقطة النهاية .
- (٦) حاصل ضرب القيمة العددية للمتجه الأول والقيمة العددية للمتجه الثانى فى جيب تمام الزاوية بينهما .
- (٧) طول المسار المقطوع أثناء الحركة من موضع الى آخر .
- (٨) المسافة المستقيمة فى اتجاه معين من نقطة بداية الى نقطة نهاية .
- (٩) كمية فيزيائية تعبر عن المسافة الفاصلة بين نقطتين مقداراً واتجاهاً .
- (١٠) حاصل ضرب القيمة العددية للمتجهين فى جيب الزاوية بينهما فى n .
- (١١) يمثل بها مقدار الكمية المتجهة .
- (١٢) يمثل بها اتجاه الكمية المتجهة .
- (١٣) القوة التى تؤثر على جسم نتيجة تأثير عدة قوى .
- (١٤) بتحريك أصابع اليد اليمنى من المتجه الأول نحو المتجه الثانى عبر الزاوية الأصغر بينهما فيكون الإبهام مشيراً لاتجاه حاصل الضرب الاتجاهى لهما .

س ٢ : اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :-

- (١) عداد قطع إزاحة مقدارها 250m شرقاً ثم عاد غرباً 100m فان المسافة التى قطعها العداء هى m (350 — 150 — 100 — 250) بينما الإزاحة التى صنعها العداء هى (350m شرقاً — 350m غرباً — 150m شرقاً — 150m غرباً)
- (٢) جسم يدور على محيط دائرة نصف قطرها r فان إزاحته عندما يكمل دورتين هى..... ($2\pi r - 0 - 2r - r$)
- (٣) إذا كانت القوة المحصلة المؤثرة على سيارة متحركة صفر فان السيارة (تتحرك بسرعة أكبر — تتوقف عن الحركة — لا تتأثر بالحركة)
- (٤) حاصل الضرب القياسى لمتجهين يتعين من العلاقة
 $(\vec{A} \cdot \vec{B} \cos \theta - A B \cos \theta - A B \sin \theta - A B \sin \theta n)$
- (٥) الكمية القياسية يلزم لتعريفها تعريفاً تاماً معرفة
 (مقدارها فقط - اتجاهها فقط - مقدارها واتجاهها معاً - لا توجد إجابة صحيحة)
- (٦) الكمية المتجهة يلزم لتعريفها تعريفاً تاماً معرفة
 (مقدارها فقط - اتجاهها فقط - مقدارها واتجاهها معاً - لا توجد إجابة صحيحة)
- (٧) من الكميات الفيزيائية القياسية
 (الطول — السرعة — الوزن — العجلة)
- (٨) جسم يتحرك على محيط دائرة نصف قطرها 7cm تكون إزاحته حينما يقطع المحيط (0 — 14 cm — 7 cm)
- (٩) صعد فأر حائطاً مسافة 4m ليلبحث عن غذائه ثم عاد ثانية للأرض فان إزاحته تساوى (0 — 4 — 16 — 8)
- (١٠) البعد المستقيم بين نقطتين فى اتجاه واحد يسمى (المسافة — الإزاحة — السرعة)
- (١١) صعد رجل نخلة ارتفاعها 5m ثم عاد للأرض تكون المسافة التى قطعها..... m (10 — 20 — 5 — 0)
 والإزاحة هى..... m (10 — 20 — 5 — 0)
- (١٢) الإزاحة كمية (قياسية — عددية — متجهة)
- (١٣) إذا مشى رجل 8m الى الأمام ثم عاد 5m فان إزاحته تكون..... (8m — 3m — 13m)

(١٤) قذف شخص كرة تنس لترتطم بحائط يبعد عنه 5m فارتدت فى يده والتقطها فان الإزاحة الحادثة.....

(7.5m - 0 - 5m - 2.5m)

(١٥) الإزاحة هى (كمية قياسية وحدتها m - كمية قياسية وحدتها m/s - كمية متجهة وحدتها m)

(١٦) يتساوى مقدار المسافة مع مقدار الإزاحة عندما يتحرك الجسم فى خط (مستقيم - منحني - دائري)

(١٧) فى الشكل الموضح بدأ جسم حركته من النقطة A متجها جنوباً للنقطة B


فقطع مسافة 40m ثم اتجه شرقاً للنقطة C التى تبعد 30m عن النقطة B

لذا فان (أ) مقدار الإزاحة للجسم يساوى.....

(طول AB - طول BC - طول AC - طول BC+AB)

(ب) طول المسافة المقطوعة يساوى.....

(طول AB - طول BC - طول AC - طول BC+AB)



(المسافة - السرعة - الكتلة - الزمن)

(١٨) كل ما يأتى من الكميات القياسية ما عدا.....

(١٩) من الوحدات المتجهة (الثانية - الجرام - النيوتن - الكيلوجرام)

(٢٠) نعتبر المتجهين متساويين إذا تساويا فى.....

- المقدار وكان لهما نفس الاتجاه ونفس نقطة البداية

- المقدار فقط

- المقدار وكان لهما نفس الاتجاه وان اختلفت نقطة البداية

- الاتجاه فقط

(٢١) فى قاعدة اليد اليمنى يشير الإبهام الى اتجاه.....

(المتجه الأول - المتجه الثانى - المتجه الأول بالنسبة للمتجه الثانى - حاصل الضرب الاتجاهى للمتجهين)

(٢٢) فى قاعدة اليد اليمنى تكون حركة الأصابع.....

- من المتجه الأول نحو المتجه الثانى .

- فى اتجاه المتجه الأول .

- من المتجه الثانى نحو المتجه الأول .

- عمودياً على المتجه الثانى .

(٢٣) يتحرك جسم على محيط دائرة نصف قطر r فتكون الإزاحة المقطوعة له عندما يكمل نصف دورة تساوى

($\frac{1}{2} r - \frac{1}{4} r - r - 2r$)

س ٤ : ما معنى قولنا أن

- ١- حاصل الضرب القياسي لمتجهين = 85.5 .
- ٢- حاصل الضرب الاتجاهى لمتجهين = $43.6 \vec{n}$.
- ٣- إزاحة سيارة = 500m شمالاً .
- ٤- العجلة كمية متجهة .
- ٥- المسافة التى يقطعها جسم فى اتجاه الشرق = 20m .
- ٦- الزمن كمية قياسية .

س ٥ : علل لما يأتى

- (١) عدم تساوى متجهين على الرغم من أن لهما نفس القيمة العددية ونفس نقطة البداية .
- (٢) عدم تغير حالة الجسم على الرغم من تأثره بأكثر من قوة .
- (٣) تعتبر المسافة كمية قياسية بينما الإزاحة كمية متجهة .
- (٤) قد يتساوى متجهين على الرغم من اختلاف نقطة بداية كلا منهما .
- (٥) تكون قيمة حاصل الضرب الاتجاهى أقصى ما يمكن عند 90° .
- (٦) ينعدم قيمة حاصل الضرب الاتجاهى عندما يكون 90° .

س ٦ : ما المقصود بكل من

- ١- الكمية المتجهة .
- ٢- الكمية القياسية .
- ٣- الضرب القياسى .
- ٤- المسافة .
- ٥- الإزاحة .
- ٦- الضرب الاتجاهى .
- ٧- القوة المحصلة .
- ٨- قاعدة اليد اليمنى .

س ٧ : صوب ما تحته خط

- (١) الكمية القياسية يلزم لتعريفها معرفة المقدار والاتجاه .
- (٢) المسافة كمية متجهة بينما الإزاحة كمية قياسية .
- (٣) عندما تنطبق نقطة البداية والنهاية فإن الإزاحة = واحد صحيح .
- (٤) تحركت حشرة مسافة 10cm ثم عادت لنقطة البداية فإنها تقطع مسافة = صفر .
- (٥) تتساوى الإزاحة مع المسافة عندما يتحرك الجسم فى مسار دائري .
- (٦) الضرب الاتجاهى هو حاصل ضرب القيمة العددية لمتجهين فى جيب الزاوية بينهما فى الضرب القياسى .
- (٧) تستخدم قاعدة اليد اليمنى لتحديد قيمة محصلة الضرب القياسى لمتجهين .
- (٨) الضرب القياسى هو حاصل ضرب القيمة العددية لمتجهين فى قيمة الزاوية بينهما .
- (٩) تمثل المتجهات بقطعة مستقيمة موجهة طولها يمثل اتجاه الكمية المتجهة .

س ٨ : متى يحدث كل من


- (١) ناتج طرح متجهين يساوى صفر .
- (٢) حاصل الضرب القياسى لمتجهين يساوى صفر .
- (٣) المجموع الاتجاهى لعدة متجهات يساوى صفر .
- (٤) تكون القيمة العددية للضرب الاتجاهى لمتجهين = القيمة العددية للضرب القياسى لهما .
- (٥) تتساوى عدديا المسافة مع الإزاحة .
- (٦) تكون إزاحة جسم مساوية للصفر رغم حركة الجسم .
- (٧) تكون إزاحة جسم يدور فى مسار دائري مساوية للصفر .

س ٩ : أسئلة متنوعة

- ١- هل تكفى المسافة بين جسمين لتحديد موقع كل منهما ؟ اشرح .
- ٢- تكلم باختصار عن جمع المتجهات .
- ٣- أذكر قاعدة اليد اليمنى .
- ٤- كيف يتم تمثيل الكمية المتجهة ؟
- ٥- تكلم باختصار عن التمثيل البياني للمتجهات .
- ٦- متى تصبح محصلة قوتين تساوى صفراً ؟


س ١٠ : ١- مسائل الكتاب المدرسي

- (١) سفينة تمر فى اتجاه الشمال بسرعة 12km/h لكنها تتحرف نحو الغرب بتأثير المد والجزر بسرعة قدرها 15km/h ، احسب مقدار واتجاه السرعة المحصلة للسفينة .
[فى اتجاه 38.66° غرباً ، 19.2 km/h]
- (٢) \vec{A} ، \vec{B} متجهان الزاوية بينهما 120° و مقدار \vec{A} يساوى 3 وحدات ، ومقدار \vec{B} يساوى 5 وحدات أوجد :
(أ) حاصل الضرب القياسى لهما . (ب) حاصل الضرب الاتجاهى لهما .
[-7.5 ، $12.99\vec{n}$]
- (٣) اوجد محصلة القوتين المتعامدتين F_1 ، F_2 مقداراً واتجاهاً حيث $F_1 = 8\text{ N}$ ، $F_2 = 6\text{ N}$ وضح الإجابة برسم المتجهات .
[10N ، 36.87°]
- (٤) راكب دراجة بخارية ينطلق نحو الشمال بسرعة 80km/h بينما تهب الرياح فى اتجاه الغرب بسرعة قدرها 50km/h احسب سرعة الرياح الظاهرية كما يلاحظها راكب الدراجة .
- (٥) متجهان قيمتهما العددية $A = 6$ ، $B = 15$ ، الزاوية بينهما 30° ، أوجد قيمة كل من حاصل الضرب القياسى و الاتجاهى لهما .
[77.94 ، $45\vec{n}$]



- (٦) جسم يتحرك على محيط دائرة نصف قطرها 7m احسب المسافة والإزاحة عندما :
 (أ) يتحرك من A الى B .
 (ب) يعود مرة أخرى الى A .
 [22m , AB → فى اتجاه , 44m , zero]

س ١٠ : ٢- مسائل من امتحانات المدارس



- (٧) إذا كانت محصلة قوتين متعامدتين هي 10N كما بالشكل ، ومقدار إحدى القوتين 8N .

(أ) ما مقدار القوة الأخرى ؟

(ب) ما الزاوية التى تصنعها مع المحصلة ؟

[6 N , 53.13°]

- (٨) متجهان قيمتهما العددية 5 , A = 10 , B ، الزاوية بينهما ٦٠° ، اوجد قيمة كل من حاصل الضرب القياسى والاتجاهى لهما .

س ١٠ : ٣- مسائل عامة للتدريب


- (٩) احسب المسافة المقطوعة والإزاحة فيما يلى :

- أ- جسم دار نصف دورة من (A) الى (B) حول حدية نصف قطرها r متر .
 ب- جسم دار دورتين كاملتين على محيط دائرة نصف قطرها 14m .
 ت- تسلق رجل بئر عمقه 60m وعندما وصل لحافته عاد لتلث عمقه اوجد الإزاحة والمسافة التى قطعها الرجل .
 ث- صنع جسم دورة كاملة حول محيط دائرة نصف قطرها (r) .
 ج- جسم تحرك على محيط دائرة قطرها 4cm وأتم 1.75 دورة .

- (١٠) عندما يتحرك جسم على دائرة طول محيطها 44m ، وطول قطرها 14m من النقطة A الى النقطة B فان :

(أ) المسافة المقطوعة = m.....

(ب) الإزاحة = m.....




- (١١) عندما يتحرك جسم من الموضع A الى الموضع B ثم غير اتجاهه الى الموضع C كما بالرسم أحسب :

(أ) المسافة المقطوعة

(ب) الإزاحة المقطوعة

(ج) المسافة والإزاحة عندما يعود الى الموضع A



[14m , AC → فى اتجاه , 24 m , zero]

- (١٢) ملعب كرة يد على هيئة مستطيل طوله 60m وعرضه 40m فما مقدار المسافة والإزاحة اللتان يقطعهما لاعب إذا قام بالدوران حول الملعب دورة كاملة .

الحركة فى خط مستقيم

الحركة

مقدمة

عندما يتغير موضع جسم خلال فترة من الزمن يكون الجسم قد تحرك ، وبناء عليه يكون هناك حالتان للجسم

(١) الجسم الساكن : هو الجسم الذى لا يتغير موضعه بمرور الزمن .

(٢) الجسم المتحرك : هو الجسم الذى يتغير موضعه بمرور الزمن .

تعريف الحركة

هى التغير الحادث فى موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع جسم آخر .

مخطط الحركة

هو مجموعة من الصور المتتابعة لجسم متحرك فى فترات زمنية متساوية والتي تجمع فى صورة واحدة .

أنواع الحركة

الحركة الدورية

هى حركة تكرر نفسها على فترات زمنية متساوية .

مثل

- (١) الحركة الدائرية فى مسار مغلق : مثل حركة الأقمار حول الكواكب أو حركة الكواكب حول النجوم أو حركة الأرجوحة الدوارة بالملاهي .
- (٢) الحركة الاهتزازية : مثل حركة بندول الساعة .
- (٣) الحركة الموجية : مثل موجات الصوت .

الحركة الانتقالية

هى حركة تتميز بوجود نقطة بداية ونقطة نهاية .

مثل:

- (١) الحركة فى خط مستقيم : تمثل أبسط أنواع الحركة وهى مثل حركة القطار .
- (٢) الحركة فى مسار منحنى : مثل حركة المقذوفات هى حركة الجسم عندما يقذف بسرعة لأعلى بزاوية ميل فى مسار منحنى يسمى قطع مكافئ . .

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|---|---|
| ١ | تعتبر حركة القطار حركة انتقالية | لأنه يتغير فيها موضع الجسم من نقطة البداية الى نقطة النهاية |
| ٢ | تعتبر الحركة الاهتزازية حركة دورية | لأنها حركة تكرر نفسها على فترات زمنية متساوية . |
| ٣ | حركة الالكترتون حول النواة حركة دورية | |
| ٤ | تختلف حركة المقذوفات عن الحركة الاهتزازية . | لان حركة المقذوفات مثال للحركة الانتقالية بينما الحركة الاهتزازية من انواع الحركة الدورية . |

السرعة

تعريفها : (١) هى الإزاحة التى يقطعها الجسم فى الثانية الواحدة . (٢) هى المعدل الزمني للتغير فى الإزاحة .

$$V = \frac{\Delta d}{\Delta t}$$

$$\text{السرعة} = \frac{\text{التغير فى الإزاحة}}{\text{التغير فى الزمن}}$$

قانونها :

(٢) كيلومتر / ساعة (km/hr)

(١) متر / ثانية (m/s)

وحدة قياسها :



| م | ما معنى قولنا أن | الإجابة |
|---|----------------------------------|---|
| ١ | سيارة تتحرك بسرعة 40 m/s | معنى ذلك أن السيارة تقطع إزاحة 40 m فى زمن قدره ثانية واحدة . |
| ٢ | جسم يقطع إزاحة 120m خلال دقيقة . | أى أن سرعة الجسم = 2m/s . |

يمكن التعبير عن السرعة بطريقتين :

| وجه المقارنة | ١- السرعة العددية (القياسية) | ٢- السرعة المتجهة |
|--------------|--|--|
| التعريف | هى المسافة التى يقطعها الجسم فى وحدة الزمن | هى الإزاحة التى يقطعها الجسم فى وحدة الزمن |
| نوع الكمية | قياسية (تحدد بالمقدار فقط) | متجهة (تحدد بالمقدار والاتجاه) . |
| الإشارة | تكون موجبة دائماً | <u>موجبة</u> إذا تحرك الجسم فى اتجاه معين <u>وسالبة</u> إذا تحرك فى عكس هذا الاتجاه . |
| أمثلة | سيارة تتحرك بسرعة 80km/h | سيارة تتحرك بسرعة 80km/h جنوباً . |

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|--|---|
| ١ | السرعة كمية متجهة . | لأنها ناتج قسمة الإزاحة وهى كمية متجهة على الزمن وهو كمية قياسية وناتج قسمة كمية متجهة على كمية قياسية يعطى كمية متجهة . |
| ٢ | السرعة كمية قياسية فى بعض القياسات ومتجهة فى قياسات أخرى . | لأنه فى بعض القياسات يمكن حساب السرعة من العلاقة (مسافة ÷ زمن) فتكون كمية قياسية وفى قياسات أخرى يتم حسابها من العلاقة (إزاحة ÷ زمن) فتكون كمية متجهة . |
| ٣ | السرعة كمية متجهة بينما مقدارها كمية قياسية . | لان السرعة ناتج قسمة كمية متجهة وهى الإزاحة على كمية قياسية وهى الزمن والناتج يكون كمية متجهة أما مقدار السرعة يلزم لمعرفته معرفة تامة معرفة المقدار فقط . |

أنواع السرعة

| وجه المقارنة | ١- السرعة المنتظمة | ٢- السرعة المتغيرة (غير منتظمة) |
|-----------------|---|--|
| التعريف | - هى السرعة التى يقطع فيها الجسم إزاحات متساوية فى أزمنة متساوية . - وتكون السرعة ثابتة فى المقدار و الاتجاه . | - هى السرعة التى يقطع فيها الجسم إزاحات غير متساوية فى أزمنة متساوية . - وتكون السرعة متغيرة فى المقدار او الاتجاه أو كلاهما معاً . |
| التمثيل البياني |  |  |

السرعة المتغيرة

| وجه المقارنة | السرعة اللحظية | السرعة المتوسطة |
|------------------------|--|--|
| التعريف | هى سرعة الجسم عند لحظة معينة . | هى الإزاحة من نقطة البداية الى نقطة النهاية مقسومة على الزمن الكلى . |
| القانون | السرعة اللحظية (v) = $\frac{\text{التغير فى الإزاحة}}{\text{زمن التغير}}$ $V = \frac{\Delta d}{\Delta t}$ | السرعة المتوسطة (\bar{V}) = $\frac{\text{الإزاحة الكلى}}{\text{الزمن الكلى}}$ $\bar{V} = \frac{d}{t} = \frac{V_f + V_i}{2}$ |
| التمثيل البياني | | |
| الميل | يتم رسم مماس للمنحنى عند النقطة التى تقابل هذه اللحظة ويكون ميل المماس هو سرعة السيارة اللحظية. | يتم رسم الخط الواصل بين نقطة بداية الحركة ونقطة نهايتها وميل هذا الخط هو السرعة المتوسطة . |

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|---|---|
| ١ | قد تتساوى السرعة المتوسطة مع السرعة اللحظية لجسم . | لان الجسم يتحرك بسرعة منتظمة . |
| ٢ | — حركة سيارة على الطريق ليست ثابتة . — يصعب تحقيق السرعة المنتظمة لسيارة . | لأنها تتغير بحسب أحوال الطريق فأحياناً تتراد وتناقص . |
| ٣ | يستخدم مصطلح السرعة المتجهة وليس السرعة العددية عند استخدام المسائل ومعادلات الحركة . | لان السرعة المتجهة هى التى تصف حركة الجسم وصفاً تاماً . |
| ٤ | اختلاف السرعة العددية عن السرعة المتجهة | لان السرعة العددية هى النسبة بين المسافة والزمن بينما السرعة المتجهة هى النسبة بين الإزاحة والزمن . |
| ٥ | السرعة المتجهة قد تكون موجبة أو سالبة | تكون موجبة إذا تحرك الجسم فى اتجاه معين وسالبة إذا تحرك فى عكس هذا الاتجاه . |
| ٦ | قد تتساوى السرعة العددية مع السرعة المتجهة . | يحدث ذلك إذا تحرك الجسم فى خط مستقيم فى اتجاه ثابت . |


| م | ما معنى قولنا أن | الإجابة |
|---|---------------------------------------|--|
| ١ | سيارة تسير بسرعة منتظمة 20m/s . | أى أن السيارة تقطع إزاحة قدرها 20m كل ثانية طول حركتها بانتظام . أو أن المعدل الزمني للتغير فى إزاحة السيارة = 20m/s . |
| ٢ | السرعة العددية لجسم 30m/s . | أى أن المسافة التى يقطعها الجسم خلال زمن قدره 1s هو 30m . |
| ٣ | السرعة المتوسطة لسيارة 50km/h شرقاً . | أى أن مقدار الإزاحة الكلية التى تقطعها السيارة مقسومة على الزمن الكلى = 50km/h شرقاً . |
| ٤ | السرعة اللحظية لقطار = 4m/s . | أى أن سرعة القطار عند لحظة معينة = 4m/s . |

ملاحظات هامة

- من التصورات الخطأ الخلط بين مصطلح السرعة المتوسطة وهى كمية متجهة ومصطلح السرعة العددية المتوسطة وهى كمية قياسية .
- عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة تكون محصلة القوى المؤثرة عليه تساوى صفر .
- قد تكون السرعة المتوسطة سالبة وقد تكون موجبة تبعاً لإشارة الإزاحة .

أمثلة محلولة

(١) قاد شخص سيارة فى خط مستقيم فقطع (8.4km) فى زمن قدره (0.12h) ، ثم نفذ منه وقود السيارة فتركها ومشى فى نفس الخط المستقيم لأقرب محطة وقود وقطع (2km) فى زمن قدره (0.5h) احسب سرعته المتوسطة من بداية الحركة حتى نهايتها وإذا افترضنا أن الشخص عاد مرة أخرى فى زمن قدره 0.6h احسب السرعة المتوسطة للحركة منذ بدايتها حتى عودته الى السيارة مرة أخرى.




$$\bar{V} = \frac{d}{t} = \frac{8.4 + 2}{0.12 + 0.5} = 16.8 \text{ km/h}$$

الحل

عندما يعود الشخص الى السيارة مرة أخرى فإن إزاحته تصبح (8.4km) كما بالرسم .

$$\bar{V} = \frac{d}{t} = \frac{8.4}{0.12 + 0.5 + 0.6} = 6.89 \text{ km/h}$$

(٢) تحركت سيارة من الموضع A الى الموضع B ثم الى الموضع C كما بالشكل فاستغرقت زمن قدره 7 دقائق احسب كلا من السرعة العددية والسرعة المتجهة



$$7 \text{ km} = 3 + 4 = \text{حساب المسافة الكلية}$$

الحل


$$V = \frac{d}{t} = \frac{7}{7} = 1 \text{ km/min}$$

$$\text{السرعة العددية} = \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن}}$$

$$\text{حساب الإزاحة} \quad \text{الإزاحة} = \sqrt{(3)^2 + (4)^2} = 5 \text{ km}$$

$$\text{السرعة المتجهة} = \frac{\text{الإزاحة}}{\text{الزمن}} = \frac{5}{7} \text{ km/min}$$

يعبر الشكل البياني عن حركة فتاة بداية من منزلها حتى عودتها مرة أخرى،
ادرس الشكل ثم أجب عن الأسئلة التالية:



متى توقفت الفتاة؟

ما أكبر سرعة تحركت بها الفتاة؟

لماذا تكون سرعة عودتها سالبة؟

ما الفرق بين الإزاحة والمسافة التي تقطعها الفتاة؟

الحل

- توقفت الفتاة عند نقطتي b , d

- أكبر سرعة تحركت بها الفتاة = 1.5m/s

$$V_{cd} = \frac{3-2}{5-4} = \frac{1}{1} = 1m/s$$

$$V_{bc} = \frac{2-2}{4-0} = \frac{0}{2} = 0m/s$$

$$V_{ab} = \frac{2-0}{2-0} = \frac{2}{2} = 1m/s$$

$$V_{ef} = \frac{0-3}{8-6} = \frac{-3}{2} = -1.5m/s$$

$$V_{de} = \frac{3-3}{6-5} = \frac{0}{1} = 0m/s$$

- تكون سرعة عودتها سالبة لأنها تتحرك فى عكس الاتجاه والدليل على ذلك ان ميل الخط لأسفل أى سالب.

- الإزاحة : d = 0 ، المسافة : S = 2 + 1 + 3 = 6m

العجلة (a)

تعريفها (١) هى التغير فى سرعة الجسم خلال وحدة الزمن .
(٢) هى المعدل الزمني للتغير فى السرعة .

الحركة المعجلة : هى الحركة التى يحدث فيها تغير فى السرعة بمرور الزمن .

$$\text{العجلة} = \frac{\text{التغير فى السرعة}}{\text{التغير فى الزمن}} = \frac{\text{السرعة النهائية} - \text{السرعة الابتدائية}}{\text{الزمن النهائي} - \text{الزمن الابتدائي}}$$

قانونها

$$a = \frac{V_2 - V_1}{t_2 - t_1}$$

(٢) كيلومتر/ساعة^٢ (km/h²)




(١) متر / ثانية^٢ (m/s²)

وحدات قياسها :

أنواع العجلة

| وجه المقارنة | العجلة المنتظمة | العجلة المتغيرة |
|-----------------|--|--|
| التعريف | العجلة التى يتحرك بها الجسم عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية فى أزمنة متساوية | العجلة التى يتحرك بها الجسم عندما تتغير سرعته بمقادير غير متساوية فى أزمنة متساوية . |
| التمثيل البياني | | |

العجلة قد تكون :

| موجبة (تزايدية) | سالبة (تناقصية) | صفر (سرعة منتظمة) |
|--|--|---|
| هى العجلة التى يتحرك بها الجسم عندما تزداد سرعته بمرور الزمن . | هى العجلة التى يتحرك بها الجسم عندما تقل سرعته بمرور الزمن . | هى العجلة التى يتحرك بها الجسم عندما تكون سرعته ثابتة . |
| تكون فيها السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية . | تكون بها السرعة النهائية أقل من السرعة الابتدائية . | تكون فيها السرعة النهائية تساوى السرعة الابتدائية . |
| تنطبق على أى حركة تبدأ من السكون وعند سقوط الأجسام راسياً لأسفل . | تنطبق على حالة استخدام الفرامل فى السيارات والقطارات والدراجات وعند قذف الأجسام راسياً لأعلى . | تنطبق على الجسم الساكن والجسم المتحرك بسرعة ثابتة . |
| التمثيل البياني : خط مستقيم يبدأ من نقطة الأصل أو من محور الزمن . | التمثيل البياني : خط مستقيم ينتهى عند محور الزمن . | التمثيل البياني : خط مستقيم يوازى محور الزمن . |
|  |  |  |
| مثال : عندما تهبط الكرة المستوى المائل تزداد سرعتها بمرور الزمن ، وبالتالي تكون العجلة موجبة . | مثال : عندما تصعد الكرة المستوى المائل تقل سرعتها بمرور الزمن وبالتالي تتحرك بعجلة سالبة . | مثال : عندما تتحرك الكرة على مستوى أفقى أملس فإن سرعتها لا تتغير وبالتالي تكون العجلة تساوى صفراً . |

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|---|--|
| ١ | العجلة كمية متجهة . | لأنها ناتج قسمة السرعة وهى كمية متجهة على الزمن وهو كمية قياسية |
| ٢ | عندما يتحرك جسم بسرعة منتظمة فإن العجلة تساوى صفر . | لأن التغير فى السرعة = صفر فيكون المعدل الزمني للتغير فى السرعة (العجلة) = صفر . |
| ٣ | أحياناً تكون العجلة تزايدية وأحياناً تكون تناقصية . | لأنه إذا كانت السرعة النهائية للجسم أكبر من سرعته الابتدائية تكون العجلة تزايدية بينما إذا كانت السرعة الابتدائية للجسم أكبر من سرعته النهائية تكون العجلة تناقصية . |
| ٤ | عندما يتحرك الجسم بعجلة فإن الخط البياني الذى يمثل العلاقة (الإزاحة - الزمن) لا يكون مستقيماً | لأن الجسم الذى يتحرك بعجلة تكون سرعته غير منتظمة وبالتالي تكون العلاقة (الإزاحة - الزمن) منحنى . |
| ٥ | الجسم الذى تكون حركته معجلة لا يمكن أن يتحرك بسرعة منتظمة . | لأن الجسم الذى يتحرك حركة معجلة تتغير سرعته بمرور الزمن |
| ٦ | تشتق وحدة قياس العجلة من وحدتي المسافة والزمن . | لأن وحدة قياس العجلة هى خارج قسمة وحدة قياس السرعة (مسافة / زمن) على وحدة قياس الزمن . |

| م | ما معنى قولنا أن | الإجابة |
|---|---|---|
| ١ | ترام يتحرك بعجلة منتظمة 60 m/s^2 | أى أن سرعة الترام تزداد بمقدار 60 m/s فى كل 1 s |
| ٢ | قطار يتحرك بعجلة منتظمة -30 m/s^2 | أى أن سرعة القطار تقل بمقدار 30 m/s فى كل 1 s |

أمثلة محلولة

(١) تتحرك سيارة بسرعة ابتدائية 15 m/s لتصل سرعتها خلال 2.5 s الى سرعة نهائية 20 m/s ، احسب العجلة التى تتحرك بها خلال تلك الفترة .

$$V_i = 15, t = 2.5, V_f = 20, a = ?$$

$$a = \frac{V_f - V_i}{t} = \frac{20 - 15}{2.5} = 2 \text{ m/s}^2$$

الحل

(٢) طائرة جامبو تلامس أرضية الممر أثناء هبوطها بسرعة ابتدائية 160 m/s وتتطلب زمناً قدره 32 s لتتوقف تماماً . احسب العجلة التى تتحرك بها خلال تلك الفترة .

$$V_i = 160, t = 32, V_f = 0, a = ?$$

$$a = \frac{V_f - V_i}{t} = \frac{0 - 160}{32} = -5 \text{ m/s}^2$$

الحل

(٣) سيارة خاصة تستطيع التحرك من السكون ، وتصل سرعتها الى 90 km/h فى 10 s ، ما العجلة التى تحركت بها السيارة ؟


$$\begin{aligned} V_i &= 0 \\ t &= 10 \\ V_f &= 90 \\ a &= ? \end{aligned}$$

$$V_f = 90 \times \frac{5}{18} = 25 \text{ m/s}$$

$$a = \frac{V_f - V_i}{t} = \frac{25 - 0}{10} = 2.5 \text{ m/s}^2$$

الحل

$v \text{ (m/s)}$



(٤) من الشكل المقابل : (أ) صف نوع الحركة خلال 12 s . (ب) احسب عجلة الحركة فى كل جزء . (ج) احسب المسافة التى قطعها الجسم خلال حركته من B الى C

الحل

(أ) * خلال الاربع ثوانى الاولى يتحرك الجسم بعجلة منتظمة موجبة .
* خلال الاربع ثوانى الثانية يتحرك الجسم بسرعة منتظمة (عجلة صفرية)
* خلال الاربع ثوانى الاخيرة يتحرك الجسم بعجلة منتظمة .

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{20 - 0}{4 - 0} = \frac{20}{4} = 5 \text{ m/s}^2$$

(ب) * من A الى B

$$a = 0$$

* من B الى C

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{0 - 20}{12 - 8} = \frac{-20}{4} = -5 \text{ m/s}^2$$

* من C الى D

$$d = V \cdot \Delta t \Rightarrow = 20 \times (8 - 4) = 80 \text{ m} \quad (\text{ج})$$

(٥) تتحرك سيارة بسرعة 30 m/s وعندما ضغط السائق على الكابح (الفرامل) توقفت السيارة خلال زمن قدره 15 s اوجد مقدار العجلة التى تتحرك بها السيارة ونوع العجلة مع ذكر السبب .


$$\begin{aligned} V_i &= 30 \\ t &= 15 \\ V_f &= 0 \\ a &= ? \end{aligned}$$

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V_f - V_i}{\Delta t} = \frac{0 - 30}{15} = -2 \text{ m/s}^2$$

الحل

العجلة منتظمة سالبة لأن السرعة النهائية (V_f) < السرعة الابتدائية (V_i) .

(١٣) عقرب ثواني طوله 7cm احسب المسافة والإزاحة عندما يتحرك لمدة 30s .



(١٤) من الشكل المقابل احسب المسافة والإزاحة الحادثة عندما يتحرك جسم من النقطة A الى النقطة C ثم يعود الى B .
[5m فى اتجاه AB , 9m]

(١٥) أراد شخص أن ينتزه حول حديقة مربعة الشكل (ABCD) طول ضلعها 100m فبدأ من A ثم اتجه الى النقطة D مروراً بالنقطتين B , C . احسب : المسافة المقطوعة — الإزاحة الحادثة .

(١٦) اوجد محصلة قوتين إحداها فى اتجاه المحور (x) وهى $F_x = 16N$ ، والأخرى فى اتجاه المحور (y) وهى $F_y = 9N$ ، ثم اوجد قيمة الزاوية التى تصنعها محصلة القوى مع المحور (x) .
[18.36° , 29.36°]

(١٧) إذا كانت محصلة قوتين F_x ، F_y هى $F = 28.3N$ وتصنع زاوية 47.86° مع اتجاه F_x فاجد F_x عندما تكون $F_y = 21N$.

(١٨) قوتان متعامدتان متساويتان $F_2 = F_1$ أثرتا على جسم ، فإذا كانت الزاوية التى تصنعها محصلة القوتين مع المحور (x) هى 45° وقيمتها العددية 20N فاجد القيمة العددية للقوتين F_1 ، F_2 .
[$14.14N$, $14.14N$]

(١٩) قوتان متعامدتان F_x ، F_y تؤثران على جسم ساكن حيث $F_y = F_x = 80 N$.
أ- اوجد محصلة القوتين F_x ، F_y .

ب- اوجد قيمة الزاوية التى تصنعها محصلة القوتين F_x ، F_y مع المحور (x) .

ت- هل يتحرك الجسم أم يظل ساكناً ؟
[يتحرك , 45° , $113.14N$]

(٢٠) غادرت ارض المطار طائرة صغيرة وبعد فترة من الزمن أعطت إشارة الى برج المراقبة أنها على بعد 215km وباتجاه يصنع زاوية 22° من الشرق الى الشمال فكم تبعد الطائرة عن برج المراقبة فى الاتجاهين شرقاً وشمالاً ؟
[$199.34 km$, $80.54 km$]

(٢١) قارب يبحر نحو الشمال بسرعة 12km/h ولكنه ينحرف نحو الغرب بتأثير المد والجزر بسرعة 5km/h احسب مقدار واتجاه السرعة المحصلة للقارب .

(٢٢) الجدول التالى يوضح الإزاحة التى قطعها جسم بمرور الزمن بالنسبة لمبنى :

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (m) | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| t (s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

أ- أرسم العلاقة البيانية بين الإزاحة d على المحور الرأسى والزمن t على المحور الأفقى .

ب- من الرسم اوجد (المسافة الكلية التى قطعها الجسم — الإزاحة) .
[10m , 2m]

الفصل الثانى

الحركة بعجلة منتظمة

معادلات الحركة فى خط مستقيم بعجلة منتظمة

المعادلة الأولى (معادلة السرعة والزمن)



إذا تغيرت سرعة جسم بمعدل ثابت من سرعة ابتدائية (V_i) الى سرعة نهائية (V_f) خلال زمن (t) فإن :
 $\Delta V = V_f - V_i$ التغير فى السرعة ، $\Delta t = t$ التغير فى الزمن

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} \Rightarrow a = \frac{V_f - V_i}{t} \Rightarrow \therefore at = V_f - V_i$$

$$V_f = V_i + at$$

أى أن : السرعة النهائية = السرعة الابتدائية + التغير فى السرعة .

العلاقة البيانية للمعادلة الأولى



المعادلة الثانية (معادلة الإزاحة والزمن)

يمكن حساب السرعة المتوسطة التى يتحرك بها الجسم باستخدام العلاقة :

$$\bar{V} = \frac{d}{t}$$

نظراً لأن الجسم يتحرك بعجلة منتظمة فانه يمكن حساب السرعة المتوسطة باستخدام العلاقة : $\bar{V} = \frac{V_i + V_f}{2}$

$$\frac{d}{t} = \frac{V_i + V_f}{2}$$

من المعادلتين السابقتين يكون :

بالتعويض عن (V_f) من المعادلة الأولى للحركة :

$$\frac{d}{t} = \frac{V_i + V_i + at}{2} = \frac{2V_i + at}{2} = \frac{2V_i}{2} + \frac{at}{2} = V_i + \frac{1}{2}at$$


بضرب الطرفين فى (t) نحصل على :

$$d = V_i t + \frac{1}{2} at^2$$




العلاقة البيانية للمعادلة الثانية

استنتاج المعادلة الثانية للحركة بيانياً



- إذا كانت الإزاحة تساوى السرعة \times الزمن فإنها فى الرسم البيانى المبين ستساوى عددياً الطول \times العرض ، وهى هنا تعبر عن المساحة تحت المنحنى ، أى أن الإزاحة = المساحة تحت منحنى (السرعة - الزمن).

- بناء على ذلك يمكن استنتاج معادلة الحركة الثانية وحساب الإزاحة المقطوعة بحساب المساحة تحت منحنى (السرعة - الزمن) المبين بالشكل البيانى التالى وذلك بتقسيم المساحة تحت المنحنى الى مستطيل ومثلث .
الإزاحة المقطوعة = المساحة المظلمة



= مساحة المستطيل السفلى + مساحة المثلث العلوي
= (الطول \times العرض) + ($\frac{1}{2}$ القاعدة \times الارتفاع) .

$$\frac{1}{2} (V_f - V_i) t + (V_i t) =$$

وبما أن : $(V_f - V_i) = at$

$$\frac{1}{2} (at) t + (V_i t) = \text{الإزاحة المقطوعة}$$

$$d = V_i t + \frac{1}{2} at^2$$

المعادلة الثالثة (معادلة الإزاحة والسرعة)

يمكن حساب الإزاحة (d) من العلاقة :

وبما أن

$$d = \bar{v} t$$



$$t = \frac{V_f - V_i}{a}, \quad \bar{v} = \frac{V_f + V_i}{2}$$

$$d = \frac{V_f + V_i}{2} \times \frac{V_f - V_i}{a} = \frac{V_f^2 - V_i^2}{2a}$$


إذا

$$2ad = V_f^2 - V_i^2$$

العلاقة البيانية للمعادلة الثالثة



إرشادات لحل مسائل معادلات الحركة



١- يستخدم المثلث المقابل لحل مسائل معادلات الحركة ، حيث يدل الرقم المكتوب بين الكميتين (المعلومة والمجهولة) على رقم معادلة الحركة المستخدمة فى الحل .

٢- فى المسائل من النوع ، جسم يتحرك طبقاً لمعادلة ما ، يجب أن تصل بالمعادلة المعطاة الى اقرب صورة لإحدى معادلات الحركة الثلاثة باتباع الآتي :

أ- إذا كان هناك جذر يجب التخلص منه بتربيع الطرفين .

ب- التخلص من أى مقام .

ت- إذا كان هناك سالب ينقل الى الطرف الاخر بالموجب .

ث- نختار المعادلة التى تشبه العلاقة ونقارن بينهما .

٣- بعض الالفاظ الهامة

أ- تكون العجلة سالبة وتسمى عجلة تناقصية وتأخذ إشارة سالبة فى القانون عند رؤية احد الالفاظ الاتية

(فرامل / كابح - قذف لأعلى - تم تبطيئه - احتكاك)

ب- تكون السرعة النهائية تساوى صفر ($V_f = 0$) عند رؤية الالفاظ الاتية (أقصى ارتفاع - حتى توقف)

ت- تكون السرعة الابتدائية تساوى صفر ($V_i = 0$) عند رؤية الالفاظ الاتية

(تحرك من السكون - سقط سقوطاً حراً)

٤- إذا تحرك جسم بسرعة منتظمة تكون السرعة النهائية تساوى السرعة الابتدائية ويكون ($a = 0$) .

٥- لتحويل وحدة قياس السرعة من km/h الى m/s نضرب فى $\frac{5}{18}$.


الحالات الخاصة لمعادلات الحركة

| الصيغة العامة | بداية الحركة من السكون $V_i = 0$ | التوقف فى نهاية الحركة $V_f = 0$ | التحرك بسرعة منتظمة $a = 0$ |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| $V_f = V_i + at$ | $V_f = at$ | $V_i = -at$ | $V_f = V_i$ |
| $d = V_i t + \frac{1}{2} at^2$ | $d = \frac{1}{2} at^2$ | $d = -\frac{1}{2} at^2$ | $d = V_i t$ |
| $2ad = V_f^2 - V_i^2$ | $2ad = V_f^2$ | $2ad = V_i^2$ | $0 = V_f^2 - V_i^2$ |

أمثلة محلولة

(١) احسب الزمن الذى تستغرقه طائرة لتتوقف تماماً عند هبوطها على مدرج المطار ، إذا علمت أن سرعتها عند ملامستها لأرض الممر 162 km/h وتم تبطيئها بانتظام بمعدل 0.5 m/s^2 .

$t = ?$
 $V_f = 0$
 $V_i = 162$
 $a = -0.5$



$$V_f = V_i + at$$

$$0 = (162 \times \frac{5}{18}) + (-0.5t)$$

$$= 45 - 0.5t$$

$$0.5t = 45 \Rightarrow t = \frac{45}{0.5} \Rightarrow t = 90s$$

الحل

- (٢) جسم يتحرك بعجلة منتظمة 6m/s^2 من السكون فما هى قيمة كلاً من :-
 ١ - سرعة الجسم بعد 8 ثوانى .
 ٢ - المسافة المقطوعة بعد 10 ثوانى .
 ٣ - المسافة المقطوعة عندما تصبح سرعة الجسم 12m/s .

| المسافة المقطوعة عند $V_f = 12$ | المسافة المقطوعة بعد 10 ثوانى | سرعة الجسم بعد 8 ثوانى |
|---|--|---|
| $V_f = V_i + at$ $12 = 0 + 6t$ $t = 2\text{s}$ $d = V_i t + \frac{1}{2} a t^2$ $d = 0 + \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12\text{m}$ | $d = V_i t + \frac{1}{2} a t^2$ $d = 0 + \frac{1}{2} \times 6 \times 100$ $d = 300\text{ m}$ | $V_f = V_i + at$ $V_f = 0 + 6 \times 8$ $V_f = 48\text{ m/s}$ |

الحل

- (٣) قطار يتحرك بسرعة 20 m/s بعجلة منتظمة تناقصية 2 m/s^2 عند استخدام الفرامل . أوجد الزمن اللازم لتوقف القطار والمسافة التى يقطعها منذ استخدام الفرامل وحتى يتوقف .


$V_i = 20$
 $a = -2$
 $V_f = 0$
 $t = ?$
 $d = ?$

$V_f = V_i + at$
 $0 = 20 + (-2 t)$
 $2t = 20 \quad t = \frac{20}{2} = 10\text{s}$

الحل

$d = V_i t + \frac{1}{2} a t^2 = (20 \times 10) + \frac{1}{2} \times -2 \times 100 = 200 - 100 = 100\text{ m}$

- (٤) يتحرك جسم طبقاً للعلاقة التالية : $V_f = \sqrt{36 + 6d}$ أوجد السرعة الابتدائية ، والعجلة التى يتحرك بها الجسم ، والمسافة التى يقطعها الجسم بعد زمن قدره 3s .



$V_f^2 = 36 + 6d$

بتربيع الطرفين :

المعادلة الثالثة للحركة : $V_f^2 = V_i^2 + 2ad$

$V_i^2 = 36 \Rightarrow V_i = 6\text{ m/s}$

$2ad = 6d \Rightarrow 2a = 6 \Rightarrow a = 3\text{m/s}^2$

$d = V_i t + \frac{1}{2} a t^2$

$d = (6 \times 3) + (\frac{1}{2} \times 3 \times 9) = 18 + 13.5 = 31.5\text{ m}$

الحل

- (٥) يتحرك جسم طبقاً للعلاقة $(d = 14t + 10t^2)$ ، أكتب : السرعة الابتدائية ، والعجلة التى يتحرك بها الجسم ، والمسافة التى يقطعها الجسم بعد زمن قدره 5 s .

$d = 14t + 10t^2$

الحل

المعادلة الثانية للحركة : $d = V_i t + \frac{1}{2} a t^2$

$V_i t = 14t \Rightarrow V_i = 14\text{ m/s}$

$\frac{1}{2} a t^2 = 10t^2 \Rightarrow a = 2 \times 10 = 20\text{ m/s}^2$

$d = V_i t + \frac{1}{2} a t^2$

$= (14 \times 5) + (\frac{1}{2} \times 20 \times 25) = 70 + 250 = 320\text{m}$

(٦) يقود شخص سيارة بسرعة منتظمة مقدارها 30 m/s ، وفجأة رأى طفلاً يركض فى الشارع فإذا كان الزمن اللازم ليضغط على الفرامل هو 0.5 s ، فتباطأت السيارة بعجلة منتظمة مقدارها 9 m/s^2 حتى توقفت ، ما الإزاحة الكلية التى قطعها السيارة قبل أن تقف ؟

الحل

١- حساب الإزاحة أثناء فترة الاستجابة (السرعة المنتظمة)

$$d_1 = v t = 30 \times 0.5 = 15 \text{ m:}$$

٢- حساب الإزاحة بعد الفرملة حتى الوقوف (السرعة تناقصية)

$$2ad_2 = V_f^2 - V_i^2$$

$$2ad_2 = -V_i^2$$

$$d_2 = \frac{-V_i^2}{2a} = \frac{-(30)^2}{2 \times -9} = 50 \text{ m}$$

$$d = d_1 + d_2 = 15 + 50 = 65 \text{ m}$$

لاحظ أن مقدار الإزاحة الكلية هى نفسها المسافة الكلية التى تقطعها السيارة لى تتوقف .

تطبيقات على الحركة بعجلة منتظمة

من أهم التطبيقات على الحركة بعجلة منتظمة : (١) السقوط الحر . (٢) المقذوفات .

أولاً - السقوط الحر

عندما يسقط جسمان مختلفان فى الوزن (كتاب وورقة) من مكان مرتفع عن سطح الأرض ، فإن هذان الجسمان يبدأ حركتهما من السكون ($V_i = 0$) متجهان لأسفل تحت تأثير :

- (١) قوة جذب الأرض لهما (وزنهما) .
- (٢) مقاومة الهواء حيث تصطدم جزيئات الهواء مع الجسم وتؤثر فى سرعة هبوطه ويظهر تأثيرها بشكل أكبر فى حالة الأجسام الخفيفة ، لذلك يصل الكتاب لسطح الأرض أسرع من الورقة .

إذا أهملنا مقاومة الهواء فإن

الجسمان يسقطا تحت تأثير وزنيهما فقط فيكتسبا عجلة ثابتة منتظمة تعمل على زيادة السرعة تدريجياً حتى تصل الى أقصى قيمة لها لحظة اصطدامها بالأرض ، وتسمى هذه العجلة **عجلة الجاذبية الأرضية (عجلة السقوط الحر)**

هى العجلة المنتظمة التى تتحرك بها الأجسام أثناء سقوطها سقوطاً حراً نحو سطح الأرض .

عجلة السقوط الحر

| ما معنى قولنا أن | الإجابة |
|--------------------------------------|--|
| عجلة السقوط الحر 9.8 m/s^2 | أى انه إذا سقط جسم سقوطاً حراً فإن سرعته تزداد تدريجياً بمقدار 9.8 m/s فى كل ثانية . |

| علل لما يأتى | الإجابة |
|--|--|
| تختلف عجلة الجاذبية من مكان لآخر على سطح الأرض | لتفلاتح الأرض قليلاً عند القطبين فتكون الأجسام عند القطب أقرب الى مركز الأرض عند خط الاستواء لذا تكون قيمة عجلة السقوط الحر عند القطب أكبر من قيمتها عند خط الاستواء . أو : لاختلاف البعد عن مركز الأرض . |

علماء أفادوا البشرية


جاليليو

قام بإسقاط جسمين مختلفين فى الكتلة من فوق برج بيزا المائل بإيطاليا ، فوجد انه بإهمال مقاومة الهواء فإن الاجسام المختلفة فى الكتلة تصل الى سطح الأرض فى نفس الوقت .

وبذلك فقد حكم فكرة أرسطو التى تنص على ان

" الاجسام ذات الكتل الكبيرة تصل الى سطح الأرض فى زمن أقل من الاجسام ذات الكتل الصغيرة "

تعيين عجلة الجاذبية الأرضية باستخدام قطرات ماء تسقط سقوطاً حراً

| | | |
|--|---|------------------------|
|  | <p>(١) إنشاء به ماء موضوع على منضدة أفقية . (٢) صنوبر يتحكم فى سقوط قطرات الماء . (٣) ساعة إيقاف . (٤) طبق معدني يحدث صوتاً عند ارتطام قطرات الماء به</p> | <p>الجهاز المستخدم</p> |
| | <p>(١) قياس الفترة الزمنية (t) التى تستغرقها قطرة ماء تسقط سقوطاً حراً مسافة رأسية معينة (d) (٢) حساب قيمة (g) بمعلومية كل من (t) ، (d) بتطبيق المعادلة الثانية للحركة .</p> | <p>فكرة التجربة</p> |
| | <p>(١) ضع الطبق المعدني أسفل فوهة الصنبور على مسافة (d = 1m) . (٢) اضبط سقوط قطرات الماء من الصنبور بحيث تسمع صوت ارتطام قطرة الماء بالطبق المعدني فى نفس اللحظة التى تبدأ فيها القطرة التالية لها فى السقوط . (٣) عين زمن سقوط 50 قطرة مثلاً واحسب الزمن (t) بين قطرتين متتاليتين من العلاقة : $t = \frac{\text{الزمن الكلى لسقوط القطرات}}{\text{عدد القطرات}}$ (٤) كرر الخطوة السابقة عدة مرات لحساب متوسط الزمن اللازم لسقوط القطرة الواحدة . (٥) احسب قيمة عجلة الجاذبية (g) باستخدام المعادلة الثانية للحركة :</p> $d = V_i t + \frac{1}{2} g t^2$ $V_i = 0$ $d = \frac{1}{2} g t^2$ $g = \frac{2d}{t^2}$ | <p>خطوات التجربة</p> |

مثال: فى تجربة لتعيين عجلة الجاذبية الأرضية باستخدام قطرات ماء تسقط سقوطاً حراً كانت المسافة بين مصدر قطرات الماء و سطح الاناء 1m وكان زمن سقوط أو ارتطام 100 قطرة متتالية هو 45s ، احسب عجلة الجاذبية الأرضية .



الحل

$$\begin{aligned} d &= 1 \\ V_i &= 0 \\ t &= ? \\ g &= ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t &= 45 \div 100 = 0.45 \text{ s} \\ g &= \frac{2d}{t^2} = \frac{2 \times 1}{0.45 \times 0.45} = 9.88 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

ثانيا- المقذوفات

(أ) المقذوفات الراسية

| عند قذف جسم من أسفل الى أعلى | عند سقوط جسم من أعلى الى أسفل |
|---|---|
| تقل السرعة تدريجياً حتى تنعدم عند أقصى ارتفاع . ($V_f = 0$) | تزداد سرعة الجسم تدريجياً حتى تصل الى أقصى قيمة لها عند سطح الأرض . ($V_i = 0$) |
| تكون قيمة عجلة الجاذبية (g) بإشارة سالبة أى أن السرعة تناقصية ، لأنه يتحرك فى عكس اتجاه قوة جذب الأرض . | تكون قيمة عجلة الجاذبية (g) بإشارة موجبة أى أن السرعة تزايدية ، لأنه يتحرك فى نفس اتجاه قوة جذب الأرض . |
| يمكن حساب قيمة (g) كالتالى : | يمكن حساب قيمة (g) كالتالى : |
| $g = \frac{V_f - V_i}{t - 0} = \frac{0 - V_i}{t - 0} = \frac{-V_i}{t}$ | $g = \frac{V_f - V_i}{t - 0} = \frac{V_f - 0}{t - 0} = \frac{V_f}{t}$ |
| يمكن تمثيل ذلك بيانياً كالتالى : | يمكن تمثيل ذلك بيانياً كالتالى : |
|  |  |

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|--|--|
| ٢ | عند سقوط جسم من سكون سقوطاً حراً تزداد سرعته . | لأنه يتحرك فى نفس اتجاه قوة جذب الأرض فتزداد سرعته بانتظام . أو : لأنه يتحرك بعجلة تزايدية عندما يتحرك فى اتجاه الجاذبية الأرضية . أو : لان الجسم يتأثر بقوة جذب الأرض له التى تكسبه عجلة منتظمة تعمل على زيادة سرعته تدريجياً حتى تصل الى أقصى قيمة لحظة اصطدامه بالأرض . |
| ٣ | تقل سرعة جسم عند قذفه بعيداً عن سطح الأرض | لأنه يتحرك بعجلة تناقصية عندما يتحرك فى عكس اتجاه الجاذبية الأرضية . |
| ٤ | عند قذف الجسم راسياً لأعلى تقل سرعته حتى تصل الى صفر عند أقصى ارتفاع . | لان الجسم يتحرك فى عكس اتجاه قوة جذب الأرض بعجلة سالبة فتقل سرعته تدريجياً حتى تنعدم عند أقصى ارتفاع . |
| ٥ | تسقط الأجسام المختلفة فى الكتلة على سطح الأرض عند تركها تسقط معاً . | لأنها تتحرك تحت تأثير عجلة الجاذبية الأرضية والتى تعمل على ازدياد سرعتها بانتظام بمقدار 9.8 m/s فى كل ثانية (أى بنفس المعدل) . |
| ٦ | قد تكون عجلة السقوط الحر موجبة وقد تكون سالبة . | لأنه إذا تحرك الجسم قوة جذب الأرض تكون عجلة السقوط الحر موجبة بينما اذا تحرك الجسم فى عكس اتجاه قوة جذب الأرض تكون عجلة السقوط الحر سالبة . |

لأنه بفرض أن العجلة أصبحت صفراً فهذا يدل على عدم تغير سرعة الجسم عند أقصى ارتفاع وبذلك يظل ساكن ومعلق فى الهواء وهو ما لا يحدث فى الواقع مما يدل على أن عجلة الجسم لا تساوى صفر.

عند قذف جسم لأعلى فإن العجلة عند أقصى ارتفاع لا تساوى صفر .

إرشادات حل المسائل

(١) سرعة الجسم عند أى نقطة أثناء الصعود = - سرعة الجسم عند نفس النقطة أثناء النزول وتدل الإشارة السالبة على أن سرعتين فى عكس الاتجاه

(٢) لحساب أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم نحسب المسافة التى يقطعها بالتعويض فى معادلة الحركة الثالثة :

$$2ad = V_f^2 - V_i^2$$

(٣) زمن الصعود = زمن الهبوط ، وإذا قذف جسم لأعلى ثم عاد ثانية للأرض يقسم الزمن على 2 .

(٤) الزمن الكلى لتحليق الجسم = ضعف زمن الصعود = ضعف زمن الهبوط .

أمثلة محلولة

(١) سقط صندوق من طائرة هليكوبتر تحلق مستقرة على ارتفاع 78.4 m فوق بقعة معينة من سطح البحر ، احسب سرعة ارتطام الصندوق بالماء بإهمال مقاومة الهواء . إذا كانت عجلة الجاذبية الأرضية 9.8 m/s² ثم احسب زمن وصول الصندوق للماء .

الحل

$$\begin{aligned} V_i &= 0 \\ d &= 78.4 \\ V_f &= ? \\ g &= 9.8 \\ t &= ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2ad &= V_f^2 - V_i^2 \\ 2 \times 9.8 \times 78.4 &= V_f^2 - 0 \\ V_f^2 &= 1536.64 & V_f &= 39.2 \text{ m/s} \\ V_f &= V_i + gt \\ t &= \frac{V_f - V_i}{g} = \frac{39.2 - 0}{9.8} = 4 \text{ s} \end{aligned}$$

(٢) سقطت تفاحة من شجرة وبعد ثانية واحدة ارتطمت بالأرض . احسب قيمة سرعة التفاحة لحظة اصطدامها بالأرض . احسب السرعة المتوسطة للتفاحة خلال السقوط ، ثم اوجد بعد التفاحة عن الأرض عن بدء السقوط . (g = 10 m/s²)

الحل

$$\begin{aligned} V_i &= 0 \\ t &= 1 \\ g &= 10 \\ d &= ? \\ V_f &= ? \\ V &= ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_f &= V_i + gt \\ V_f &= 0 + (10 \times 1) = 10 \text{ m/s} \\ \bar{V} &= \frac{V_f + V_i}{2} = \frac{10 + 0}{2} = 5 \text{ m/s} \\ d &= V_i t + \frac{1}{2} gt^2 \\ &= (0 \times 1) + (\frac{1}{2} \times 10 \times 1) = 5 \text{ m} \end{aligned}$$

(٣) حجر يسقط من سطح منزل ، فمر أمام شخص يقف فى إحدى شرفات المنزل على ارتفاع 5m من سطح الأرض بعد 4s من لحظة السقوط ، اوجد : ارتفاع المنزل ، وسرعة الحجر عندما مر أمام الشخص . (g = 10 m/s²)

$V_i = 0$
 $t = 4$
 $g = 10$
 $d = ?$
 $V_f = ?$

$$d = V_i t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$= (0 \times 4) + (\frac{1}{2} \times 10 \times 16) = 80 \text{ m}$$

$$\text{ارتفاع المبنى } H = 80 + 5 = 85 \text{ m}$$

$$V_f = V_i + g t$$

$$= 0 + (10 \times 4) = 40 \text{ m/s}$$

الحل

| الزمن (s) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
|--------------|---|------|----|-------|----|
| الإزاحة (m) | 0 | 1.25 | 5 | 11.25 | 20 |
| السرعة (m/s) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |

(٤) الجدول المقابل يوضح العلاقة بين السرعة

والإزاحة والزمن لجسم متحرك :

(أ) باستخدام الجدول ارسم العلاقة البيانية


(الإزاحة - الزمن) والعلاقة (السرعة - الزمن)

(ب) ما الذى يدل عليه زيادة التباعد بين مواقع الجسم


بمرور الزمن ؟

(ت) استخدم معادلات الحركة فى حساب الإزاحة والسرعة بعد مرور 3s .

الإزاحة (m)



السرعة (m/s)



الحل

(ب) يدل التباعد بين مواقع الجسم بمرور الزمن على أن الجسم يتحرك بسرعة تزايدية (عجلة موجبة) .

(ت) لحساب العجلة (a) التى يتحرك بها الجسم نحسب ميل المستقيم فى العلاقة (السرعة - الزمن) :

$$a = \frac{20 - 10}{2 - 1} = 10 \text{ m/s}^2$$

$$d = V_i t + \frac{1}{2} a t^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 10 \times (3)^2 = 45 \text{ m}$$

$$V_f = V_i + a t = 0 + 10 \times 3 = 30 \text{ m/s}$$

(٥) قذف جسيم رأسياً لأعلى بسرعة 49 m/s احسب أقصى ارتفاع يصل اليه والزمن لذلك ($g = 10 \text{ m/s}^2$) .

$V_f = ?$
 $V_i = 49$
 $d = ?$
 $g = -10$
 $t = ?$

$$2ad = V_f^2 - V_i^2$$

$$2 \times -10 \times d = 0 - (49)^2$$

$$-20 d = -2401 \Rightarrow d = 120.05 \text{ m}$$

$$V_f = V_i + g t$$

$$0 = 49 + (-10 t)$$

$$10 t = 49$$

$$t = 49 \div 10 = 4.9 \text{ s}$$

الحل

(٦) قذف جسيم رأسياً لأسفل فإذا علمت ان الجسم تحرك مسافة 19.6 m حتى يلامس سطح الارض أحسب السرعة النهائية للجسم والزمن اللازم حتى يلامس سطح الارض ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$).

الحل

$$\begin{aligned} V_f &= ? \\ V_i &= 0 \\ d &= 19.6 \\ g &= 9.8 \\ t &= ? \end{aligned}$$

$$2ad = V_f^2 - V_i^2$$

$$2 \times 9.8 \times 19.6 = V_f^2 - 0$$

$$V_f^2 = 384.16 \quad \Rightarrow \quad V_f = 19.6 \text{ m/s}$$

$$V_f = V_i + gt$$



$$19.6 = 0 + 9.8 t$$

$$t = 19.6 \div 9.8 = 2 \text{ s}$$

(٧) الجدول التالى يعبر عن قيم كل من الازاحة والزمن والسرعة لجسم يقذف رأسياً بسرعة ابتدائية (20 m/s)

| t (s) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
|-----------|----|------|----|-------|----|-------|-----|------|-----|
| d (m) | 0 | 8.75 | 15 | 18.75 | 20 | 18.75 | 15 | 8.75 | 0 |
| V (m/s) | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 |

ويمكن تمثيل هذه الحركة باستخدام الاشكال التالية :



شكل (٢١) مسار حركة الجسم المفلوف شكل (٢٢) : تغير إزاحة الجسم مع الزمن شكل (٢٣) تغير سرعة الجسم مع الزمن

(أ) عين سرعة الجسم عند النقاط P , Q , N من خلال المنحنى البياني (الازاحة - الزمن) ثم عينها مرة أخرى من خلال المنحنى البياني (السرعة - الزمن) .
(ب) ما قيمة ميل المنحنى (السرعة - الزمن) ؟ وعلام يدل هذا الميل ؟ ولماذا يكون بإشارة سالبة ؟
(ت) أحسب المسافة و الازاحة من بداية الحركة الى نهايتها .

الحل

(أ) من المنحنى (الإزاحة - الزمن) :

$$V_P = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{20 - 10}{1.5 - 0.5} = 10 \text{ m/s}$$

$$V_Q = 0$$

$$V_N = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{10 - 20}{3.5 - 2.5} = -10 \text{ m/s}$$

ميل المماس عند النقطة P

ميل المماس عن النقطة Q

ميل المماس عند النقطة N

من المنحنى (السرعة - الزمن) نحصل على نفس القيم .

$$\text{الميل} = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{0 - 20}{2 - 0} = -10 \text{ m/s}$$


(ب)

الميل يعبر عن العجلة التى يتحرك بها الجسم (عجلة السقوط الحر) ، وهو بإشارة سالبة لأن سرعة الجسم تقل كلما ابتعد عن سطح الارض .

(ت) المسافة = 40 m ، الإزاحة = 0

(ب) المقذوفات بزاوية (الحركة فى بعدين) :

عندما ينطلق مقذوف مثل كرة او رصاصة او ماء نافورة او دانة مدفع بسرعة ابتدائية V_i وبزاوية (θ) مع المستوى الأفقى فانه يتخذ مساراً منحنياً ، ويمكن تحليل السرعة فى اتجاهين افقى (x) و رأسى (y) كما بالشكل



السرعة فى الاتجاه الأفقى (x)

— تتحرك فيه الكرة بسرعة ابتدائية منتظمة (V_{ix}) وذلك بفرض عدم وجود قوة احتكاك ويمكن حساب هذه السرعة من العلاقة .

$$V_{ix} = V_i \cos \theta$$

— وبمعلومية (V_{ix}) ، ($a_x = 0$) يمكن حساب السرعة النهائية (V_{fx}) باستخدام معادلات الحركة الثلاثة .


السرعة فى الاتجاه الرأسى (y)

— تتحرك فيه الكرة تحت تأثير عجلة السقوط الحر ، وبالتالي تكون السرعة متغيرة ويمكن تعيين السرعة الابتدائية (V_{iy}) فى الاتجاه الرأسى من العلاقة

$$V_{iy} = V_i \sin \theta$$

— وبمعلومية (V_{iy}) ، ($a_y = g = -10 \text{ m/s}^2$) يمكن حساب (V_{fy}) باستخدام معادلات الحركة.

ونحسب سرعة الكرة عند أى لحظة من نظرية فيثاغورث



$$V_f = \sqrt{(V_{fx})^2 + (V_{fy})^2}$$

استنتاج زمن الصعود (t)

نعوض بـ ($V_{fy} = 0$) فى المعادلة الأولى للحركة فيكون :

$$V_{fy} = V_{iy} + gt \Rightarrow 0 = V_{iy} + gt$$

$$-V_{iy} = gt$$

$$t = \frac{-V_{iy}}{g}$$

زمن التحليق (T)


هو الزمن بين بداية حركة الجسم حتى وصوله الى الارض عند نقطة النهاية و يكون زمن التحليق (T) ضعف زمن الصعود (t)

$$T = 2t = \frac{-2V_{iy}}{g}$$

استنتاج أقصى ارتفاع رأسي (h)

عندما يصل الجسم الى أقصى ارتفاع تنعدم السرعة فى الاتجاه الرأسي ونعوض بـ ($V_{fy} = 0$) فى المعادلة الثالثة للحركة فيكون:

$$2gh = V_{fy}^2 - V_{iy}^2 \Rightarrow 2gh = -V_{iy}^2$$



$$h = \frac{-V_{iy}^2}{2g}$$

استنتاج أقصى مدى أفقي (R)

- هو أقصى مسافة أفقية يقطعها الجسم
- لاحظ أن زمن أقصى مدى أفقي = زمن التحليق T .
- بالتعويض عن ($a_x = 0$) ، ($d = R$) فى معادلة الحركة الثانية نجد أن

$$d = V_{ix}T + \frac{1}{2}g_x t$$

$$R = V_{ix}T = 2V_{ix}t = \frac{-2V_{ix}V_{iy}}{g}$$

أمثلة محلولة

(١) انطلقت دراجة نارية بسرعة 15 m/s وفى اتجاه يصنع زاوية 30° مع الأفقي ، ما أقصى ارتفاع تصل إليه الدراجة ؟ وما زمن تحليقها ؟ وما أقصى مدى أفقي يمكن أن تصل إليه الدراجة ؟

$$\begin{aligned} V_i &= 15 \\ \theta &= 30 \\ h &= ? \\ T &= ? \\ R &= ? \end{aligned}$$

$$V_{ix} = V_i \cos \theta = 15 \times \cos 30 = 15 \times 0.866 = 13 \text{ m/s}$$

$$V_{iy} = V_i \sin \theta = 15 \times \sin 30 = 15 \times 0.5 = 7.5 \text{ m/s}$$

$$h = \frac{-V_{iy}^2}{2g} = \frac{-(7.5)^2}{2 \times (-10)} = 2.8 \text{ m}$$

$$T = 2t = \frac{-2V_{iy}}{g} = \frac{-2 \times 7.5}{-10} = 1.5 \text{ s}$$

$$R = V_{ix}T = 13 \times 1.5 = 19.5 \text{ m}$$

الحل

(٢) شخص يقف على سطح مبنى ، يقذف كرة بسرعة ابتدائية 40 m/s فى اتجاه يصنع زاوية 30° مع الأفقى ، فإذا استغرقت الكرة زمن 4s لتصل الى سطح الأرض .
(أ) ما ارتفاع المبنى .
(ب) على أى مسافة من قاعدة المبنى يسقط الجسم ؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

الحل

$$V_{iy} = V_i \sin \theta = 40 \sin 30 =$$

$$(أ) \quad 20 \text{ m/s}$$

$$h = V_{iy} t + \frac{1}{2} g t^2 = (20 \times 4) + \left(\frac{1}{2} \times 10 \times (4)^2\right) = 160 \text{ m}$$

$$V_{ix} = V_i \cos \theta = 40 \cos 30 = 34.64 \text{ m/s}$$

$$d = V_{ix} t = 34.64 \times 4 = 138.56 \text{ m}$$

(ب)

(٣) اثبت أن المسافة الأفقية للمقذوف بزاوية $(60^\circ, 30^\circ)$ متساوية .

الحل

عند القذف بزاوية 60° :

(زمن الصعود)

$$t = \frac{V_{iy}}{g}$$

(زمن الصعود والهبوط)

$$t = \frac{2V \sin 60_i}{g}$$

$$X_1 = \frac{V_i \cos 60 \times 2V_i \sin 60}{g}$$

$$X_2 = \frac{V_i \cos 30 \times 2V_i \sin 30}{g}$$

عند القذف بزاوية 30° :

$$\frac{X_1}{X_2} = \frac{\cos 60 \times \sin 30}{\cos 30 \times \sin 60} = \frac{1}{1}$$

بقسمة X_1 على X_2 :

واكبر مدى أفقى عند القذف بزاوية 45° لأن اكبر زاوية هى : $\cos 45 \times \sin 45$

المدى الأفقى لجسم مقذوف بزاوية 30° هو نفسه المدى الأفقى لجسم مقذوف بزاوية 60° عند

حل

قذفهما بنفس السرعة .

لأن المدى الأفقى لمقذوفين يتساوى إذا كان مجموع زاوية ميل الأول والثاني يساوى 90° .

| م | متى يحدث الآتي ؟ | الإجابة |
|---|--|---------------------------------------|
| ١ | يصل الجسم المقذوف الى أقصى مدى أفقى له | عند قذفه بزاوية 45° . |
| ٢ | يتساوى المدى الأفقى لجسم مقذوف ؟ | عند قذفه بزاويتين مجموعهما 90° |

القوة والحركة

قوانين نيوتن الثلاثة للحركة

قانون نيوتن الأول للحركة:

يظل الجسم على حالته من سكون أو حركة منتظمة فى خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة محصلة تغير من حالته.

الصيغة الرياضية :

$$\sum F = 0 \quad (\text{الرمز } \sum \text{ يسمى سيجما وترمز الى محصلة القوى ، } F \text{ ترمز الى القوة})$$

أى انه :

- إذا أثر على الجسم أكثر من قوة ولكن يلغى تأثير بعضها بعض عندئذ يقال أن محصلة القوة المحصلة تساوى صفر .
- عندما تكون القوة المؤثرة على الجسم تساوى صفراً فإن العجلة تساوى صفراً فلا تتغير سرعة الجسم سواء كان ساكناً أو متحركاً .
- نحتاج قوة لتحريك الأجسام الساكنة أو إيقاف الأجسام المتحركة ولكننا لا نحتاج قوة لجعلها تستمر فى حركتها بسرعة ثابتة .

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|---|--|
| ١ | عدم تحرك جسم رغم تأثره بعدة قوى . | لأنه يقع تحت تأثير قوى متزنة (متساوية فى المقدار ومتضادة فى الاتجاه) |
| ٢ | السكون ليس هو المظهر الوحيد للجسم المتزن. | لأن الجسم المتزن قد يكون متحركاً ومحصلة القوى المؤثرة عليه تساوى صفر . |

القصور الذاتى

- (١) هو ميل الجسم الساكن الى البقاء فى حالة السكون وميل الجسم المتحرك للاستمرار فى الحركة بسرعتة الأصلية فى خط مستقيم .
- (٢) هو خاصية مقاومة الأجسام لتغيير حالتها من السكون أو الحركة .

تعريفه

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|--|---|
| ١ | يسمى القانون الأول لنيوتن بقانون القصور الذاتى . | لأن الجسم يكون قاصراً عن تغيير حالته من السكون أو الحركة بنفسه . |
| ٢ | تتناقص سرعة الجسم عندما يتحرك فى خط مستقيم | لأنه يقع تحت تأثير قوى متزنة (متساوية فى المقدار ومتضادة فى الاتجاه) . |
| ٣ | لا تحتاج صواريخ الفضاء عقب خروجها من الجاذبية الأرضية الى استهلاك وقود لكي تتحرك | لأن القصور الذاتى يحافظ على حركتها بسرعة منتظمة وفى خط مستقيم . |
| ٤ | يندفع ركاب السارة للخلف عند تحريكها للأمام فجأة . | لأن الجزء العلوى من الجسم يحاول بخاصية القصور الذاتى الاحتفاظ بحالة السكون التى كان عليها فيندفع للخلف عند تحريك السيارة فجأة . |

| | | |
|---|--|---|
| ٥ | يُندفع ركاب السيارة الى الأمام عند توقف السيارة فجأة . | لان الجزء العلوى من الجسم يحاول بخاصية القصور الذاتى الاحتفاظ بحالة الحركة التى كان عليها فيندفع للأمام عند توقف السيارة فجأة . |
| ٦ | يجب ارتداء حزام الأمان أثناء قيادة السيارة . | لتقليل اندفاع الجسم للأمام أثناء التصادم فجأة نتيجة تأثره بالقصور الذاتى مما يقلل من نسبة الإصابات . |
| ٧ | تستمر المروحة فى الدوران بعد انقطاع التيار الكهربى عنها . | بسبب خاصية القصور الذاتى حيث تحاول المروحة الاحتفاظ بحركتها. أى حالتها الموجودة عليها . |
| ٨ | سقوط قطعة نقود فى الكوب عند سحب لوح الورق من تحتها بسرعة . | بسبب خاصية القصور الذاتى حيث تحاول قطعة النقود الاحتفاظ بحالة السكون التى كانت عليها . |

كمية التحرك (P)

— **تعريفها :** هى حاصل ضرب كتلة الجسم فى سرعته .

— **قانونها :** كمية التحرك = الكتلة × السرعة


$$P = m v$$

— **وحدة قياسها :** kg . m/s

— **العوامل التى تتوقف عليها :** (١) سرعة الجسم : تتناسب كمية التحرك طردياً مع سرعة الجسم عند ثبوت الكتلة .
(٢) كتلة الجسم : تتناسب كمية التحرك طردياً مع كتلة الجسم عند ثبوت السرعة .



$$\text{الميل} = P \div v = m$$



$$\text{الميل} = P \div m = v$$

ما معنى قولنا أن كمية التحرك لجسم 40kg.m/s

أى أن حاصل ضرب كتلة الجسم فى سرعته = 40 kg . m/ s

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|---|---|
| ١ | كمية التحرك كمية متجهة | لأنها حاصل ضرب كمية قياسية (الكتلة) × كمية متجهة (السرعة) |
| ٢ | كمية التحرك لرجل يجرى أكبر من كمية التحرك لقطار ساكن . | لان كمية التحرك لجسم هى حاصل ضرب كتلة الجسم فى سرعته وحيث أن سرعة القطار وهو ساكن تساوى صفر فتكون كميته تحركه تساوى صفر |
| ٣ | يسهل تحريك جسم كتلته صغيرة بينما يصعب تحريك جسم كتلته كبيرة . | لان الكتل الصغيرة يكون قصورها الذاتى صغير بينما الكتل الكبيرة يكون قصورها الذاتى كبير . |
| ٤ | يصعب إيقاف جسم كتلته كبيرة بينما يسهل إيقاف جسم كتلته صغيرة . | لان القصور الذاتى يزداد بزيادة الكتلة . أو لان القصور الذاتى يتناسب طردياً مع الكتلة . |

قانون نيوتن الثانى للحركة:

القوة المحصلة المؤثرة على جسم تساوى المعدل الزمني للتغير فى كمية تحرك هذا الجسم .

أو

إذا أثرت قوة محصلة على جسم أكسبته عجلة تتناسب طردياً مع القوة المؤثرة على الجسم وعكسياً مع كتلته .

استنتاج الصيغة الرياضية :

$$(1) \text{ من قانون نيوتن الثانى : } F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{\Delta m V}{\Delta t} = \frac{m V_f - m V_i}{\Delta t} = m \frac{V_f - V_i}{\Delta t} = m \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

$$(2) \text{ وبما أن } a = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

$$(3) \text{ إذا } F = m a \quad \text{لذا فإن } a = \frac{F}{m}$$



(1) ما معنى أن العجلة تتناسب طردياً مع القوة ؟

- أى انه القوة الأكبر ينتج عنها عجلة أكبر والقوة الأقل ينتج عنها عجلة أقل
- أى انه إذا أثرت قوتان مختلفتان على كتلتين متساويتين فان القوة الأكبر تحرك الجسم بعجلة أكبر .



(2) ما معنى أن العجلة تتناسب عكسياً مع الكتلة ؟

- أى أن الكتلة الأقل تكتسب عجلة أكبر والكتلة الأكبر تكتسب عجلة أقل
- أى انه إذا أثرت قوة ثابتة على كتلتين مختلفتين فان الكتلة الأكبر تتحرك بعجلة أقل .

ملاحظات هامة




(1) إذا نقصت كتلة الجسم الى النصف وزادت العجلة الى الضعف فان القوة المحركة تظل كما هي .

(2) إذا نقصت كتلة الجسم الى النصف وزادت القوة المحركة الى الضعف فان عجلة الحركة تزداد إلى أربعة أمثالها .

(3) عند وجود قوة إحتكاك بين سطح وجسم يتحرك نتيجة تأثير قوة عليه فان $F_{\text{احتكاك}} - F_{\text{مؤثرة}} = F_{\text{محركة}}$

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|---|--|
| ١ | القوة كمية متجهة | لأنها حاصل ضرب كمية قياسية (الكتلة) \times كمية متجهة (العجلة) |
| ٢ | تزداد العجلة التى يتحرك بها جسم بزيادة القوة المؤثرة عليه . | لان القوة تتناسب طردياً مع العجلة التى يتحرك بها الجسم عند ثبوت الكتلة . |

العلاقات البيانية



القوة




- **تعريفها :** هى مؤثر خارجي يؤثر على الجسم فيسبب تغييراً في حالته أو اتجاهه أو كلاهما.
- **كمية متجهة :** لانها حاصل ضرب كمية قياسية (الكتلة) في كمية متجهة (العجلة)
- **جهاز قياسها :** الميزان الزنبركى
- **وحدة قياسها :** تقاس فى النظام الدولى بوحدة تسمى النيوتن (N) وهو يعادل kg.m/s^2 أى أن ($1\text{N} = \text{kg.m/s}^2$) .
- **معادلة أبعادها :** MLT^{-2}
- **تعريف النيوتن :** هو مقدار القوة التى إذا أثرت على جسم كتلته 1 kg تكسبه عجلة مقدارها 1 m/s^2 .
- **العوامل التى تتوقف عليها :**
- (1) **كتلة الجسم :** تتناسب القوة المؤثرة على جسم طردياً مع كتلة الجسم عند ثبوت العجلة .
- (2) **العجلة التى يتحرك بها الجسم :** تتناسب القوة المؤثرة على جسم طردياً مع العجلة التى يتحرك بها الجسم عند ثبوت الكتلة .

ما معنى قولنا أن القوة المؤثرة على جسم = 20 N
أى أن حاصل ضرب كتلة الجسم فى عجلة تحركه = 20 N

لا تقاس القوة بالميزان ذو الكفتين

لان الميزان ذو الكفتين يقارن بين كتلتين لان العجلة ثابتة .

تطبيقات حياتية



— تبعاً لقانون نيوتن الثانى $F = m \frac{\Delta V}{\Delta t}$ فإن القوة المؤثرة على الجسم :

- **تزداد :** بزيادة كتلة الجسم والتغير فى سرعته .
- **تقل :** بزيادة زمن التأثير (زمن التغير فى كمية التحرك) .

— **من ذلك يمكن تفسير بعض الظواهر الحياتية مثل :**

(1) اصطدام سيارة بحائط يكون أكثر تدميراً من اصطدامها بكومة من القش .

(2) سقوط شخص من مكان مرتفع فى الماء يكون أقل إصابة من سقوطه على الأرض وتزداد حدة الإصابة بزيادة الارتفاع الذى يسقط منه الشخص .

(3) سقوط بيضة على وسادة لا يجعلها تنكسر بينما تنكسر عند سقوطها على الأرض

(4) اصطدام شاحنة كبيرة بحائط يكون أكثر تدميراً من اصطدام شاحنة صغيرة .

(5) استخدام الوسائد الهوائية فى السيارات لحماية السائق عند حدوث تصادم .

وفى ضوء مما سبق فعند زيادة الفترة الزمنية للتغير فى كمية التحرك يقل قوة التصادم (والعكس صحيح)

أمثلة محلولة

(1) أثرت قوة على جسم كتلته 3 kg ، فتحرك من السكون حتى وصلت سرعته الى 30 m/s ، بعد أن قطع مسافة 10 m احسب القوة المؤثرة.

الحل

$$\begin{aligned} m &= 3 \\ V_i &= 0 \\ V_f &= 30 \\ d &= 10 \\ F &= ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_f^2 &= V_i^2 + 2ad \\ (30)^2 &= 0 + (2 \times a \times 10) = 20a \\ a &= 900 \div 20 = 45 \text{ m/s} \\ F &= ma = 3 \times 45 = 135 \text{ N} \end{aligned}$$

(٢) أثرت قوة مقدارها 30 N على جسم كتلته 2 kg ، فتحرك بعجلة مقدارها 5 m/s² ، أحسب قوى الاحتكاك بين الجسم والسطح .

الحل

$$\begin{aligned} F &= 30 \\ m &= 2 \\ a &= 5 \\ F_{\text{احتكاك}} &= ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{\text{محركة}} &= ma = 2 \times 5 = 10 \text{ N} \\ F_{\text{احتكاك}} &= F_{\text{مؤثرة}} - F_{\text{محركة}} \\ F_{\text{احتكاك}} &= 30 - 10 = 20 \text{ N} \end{aligned}$$

(٣) تؤثر قوة مقدارها 30 N على مكعب خشبي فتكسبه عجلة معلومة ، وعندما تؤثر القوة نفسها على مكعب آخر تكسبه عجلة أكبر بثلاثة أمثال ، أحسب النسبة بين كتلة المكعب الأول الى كتلة المكعب الثانى .

الحل

$$\begin{aligned} F &= 30 \\ a_2 &= 3a_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= m_1 a_1 , F = m_2 a_2 \\ m_1 a_1 &= m_2 a_2 = m_2 (3a_1) \\ m_1 &= 3m_2 \\ \frac{m_1}{m_2} &= \frac{3}{1} \end{aligned}$$

الكتلة والوزن

| الوزن | الكتلة | وجه المقارنة |
|--------------------------|---|----------------------|
| هو قوة جذب الأرض للجسم . | هى مقدار ممانعة الجسم لأى تغيير فى حالته الحركية الانتقالية . | التعريف |
| كمية متجهة | كمية قياسية | نوعها |
| نحو مركز الأرض | ليس لها اتجاه | اتجاهها |
| $W = m g$ | $m = \frac{F}{a}$ | العلاقة المعبرة عنها |
| النيوتن (N) | الكيلوجرام (kg) | وحدة القياس |
| يتغير من مكان لآخر . | لا تتغير بتغير المكان (ثابتة) | التأثر بالمكان |

| م | ما معنى أن | الإجابة |
|---|--------------------|--|
| ١ | كتلة جسم = 20 kg ؟ | أى أن مقدار ممانعة الجسم لأى تغيير فى حالته الحركية الانتقالية = 20 kg |
| ٢ | وزن جسم = 200 N ؟ | أى أن قوة جذب الأرض للجسم = 200 N . |

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|--|--|
| ١ | لا يمكن ملاحظة حركة الأرض نحو الأجسام التى تتحرك نحوها | لان كتلة الأرض كبيرة جداً لذلك تكون العجلة التى تكتسبها صغيرة جداً |
| ٢ | يفضل استيراد البضائع من الخارج بالكتلة وليس بالوزن . | لان الكتلة ثابتة لا تتغير بتغير المكان بينما الوزن يتغير بتغير المكان . |
| ٣ | وزن الجسم دائماً أكبر من كتلته . | لان الوزن = الكتلة × عجلة الجاذبية ، وعجلة الجاذبية أكبر من الواحد الصحيح . |
| ٤ | الكتلة كمية قياسية والوزن كمية متجهة . | لان الكتلة تعرف تعريفاً تاماً بمعرفة المقدار فقط ، بينما الوزن حاصل ضرب كمية قياسية (الكتلة) × كمية متجهة (العجلة) . |
| ٥ | يختلف وزن الجسم من موضع لآخر على سطح الأرض . | لان عجلة الجاذبية الأرضية تختلف من مكان لآخر على سطح الأرض . |
| ٦ | وزن جسم عند القطبين أكبر من وزنه عند خط الاستواء . | نظراً لتقلطح الأرض عند القطبين وبالتالي قرب القطبين لمركز الأرض عند خط الاستواء فان عجلة الجاذبية عند القطبين أكبر منها عند خط الاستواء وبالتالي يزداد الوزن عند القطبين عنه عند خط الاستواء . |
| ٧ | وزن جسم على قمة جبل أقل من وزنه على سطح الأرض . | لان عجلة الجاذبية الأرضية تقل بالارتفاع لأعلى . |
| ٨ | عدم تأثر وزن الشخص داخل السيارة بالعجلة التى تتحرك بها السيارة | لان الوزن = كتلة الجسم × عجلة الجاذبية والوزن يتوقف على عجلة الجاذبية وليس العجلة الخطية . |
| ٩ | اختلاف كتله الجسم عن وزنه | لان الكتلة هى مقدار ممانعة الجسم لأى تغيير فى حالته الحركية الانتقالية بينما الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم . |

أمثلة محلولة

(١) ما القوة التى تؤثر على شخص كتلته 80 kg عندما يكون فى سيارة تتحرك بعجلة 2 m/s^2 علماً بان عجلة الجاذبية الأرضية 9.8 m/s^2 .

الحل

$$w = m g = 80 \times 9.8 = 784 \text{ N}$$

(٢) يتولى ونش المرور سحب سيارة بقوة 3000 N ليكسبها عجلة 3 m/s^2 فإذا كانت عجلة الجاذبية 9.8 m/s^2 فاوجد كتلة ووزن السيارة .

الحل

$$m = F \div a = 3000 \div 3 = 1000 \text{ kg}$$

$$w = m g = 1000 \times 9.8 = 9800 \text{ N}$$

قانون نيوتن الثالث للحركة:

عندما يؤثر جسم ما على جسم اخر بقوة فان الجسم الثانى يؤثر على الجسم الأول بقوة مساوية لها فى المقدار ومضادة لها فى الاتجاه . أو : لكل فعل رد فعل مساو له فى المقدار ومضاد له فى الاتجاه .

الصيغة الرياضية :

- إذا كان الجسمان فى حالة سكون فإن : $F_1 = -F_2$
- إذا كان الجسمان فى حالة حركة فإن : $m_1 a_1 = -m_2 a_2$

والإشارة السالبة تعنى أن القوتين فى اتجاهين متضادين .

| م | علل لما يأتى | الإجابة |
|---|---|--|
| ١ | بالرغم من تساوى قوتا الفعل ورد الفعل إلا أنهما لا يحدثان اتزان . | لأنهما يؤثران على جسمين وليس على جسم واحد . |
| ٢ | يجب على الجندي تثبيت البندقية تماماً على كتفه أثناء إطلاق النار . | لأنه عند خروج الطلقة للأمام بقوة كبيرة تندفع البندقية للخلف بنفس القوة (قوة فعل ورد فعل) فإذا لم تكن البندقية مثبتة تماماً تؤدي إلى كسر كتف الجندي . أو : لكي يقل من ارتداد البندقية إلى الخلف كرد فعل عليها عند خروج القذيفة منها للأمام |
| ٣ | بنفذ المسمار داخل الخشب عند الطرق عليه | لان قوة فعل المطرقة على المسمار أكبر من قوة رد فعل الخشب على المسمار . |
| ٤ | لا توجد فى الكون قوة مفردة . | لان طبقاً لقانون نيوتن الثالث عند وجود قوة فعل فإنها تلقائياً تولد قوة رد فعل مساوية لها مقداراً و مضادة لها فى الاتجاه . |
| ٥ | تعتمد فكرة عمل الصاروخ على قانون نيوتن الثالث . | لأنه تندفع كتلة ضخمة من الغازات المشتعلة إلى أسفل الصاروخ فيكون رد فعل الصاروخ الاندفاع لأعلى . |

أمثلة محلولة

(١) قفز سباح فى احد حمامات السباحة فما العجلة التى تتحرك بها الأرض نحو السباح علماً بأن كتلة الأرض $6 \times 10^{24} \text{ kg}$ وعجلة الجاذبية 9.8 m/s^2 وكتلة هذا السباح 80 kg ؟


| السباح | الأرض |
|-------------|--------------------------|
| $m_1 = 80$ | $m_2 = 6 \times 10^{24}$ |
| $a_1 = 9.8$ | $a_2 = ?$ |

$$m_1 a_1 = -m_2 a_2$$

$$80 \times 9.8 = -6 \times 10^{24} \times a_2$$

$$a_2 = (80 \times 9.8) \div 6 \times 10^{24} = 13.1 \times 10^{-23} \text{ m/s}^2$$

الحل



(٢) لاحظ الشكل المقابل ، ثم اجب عن الأسئلة التالية

(أ) ما العلاقة بين القوة المؤثرة على الفيل والقوة المؤثرة على الشخص ؟ (ب) لماذا تكون قوة الفعل على الفيل ورد الفعل على الشخص قوتين غير مترنيتي (ج) إذا كانت كتلة الفيل تساوى 6 مرات قدر كتلة الرجل ، فأحسب العجلة التى يتحرك بها الفيل إذا تحرك الرجل بعجلة 2 m/s^2 ؟ لماذا تكون عجلة الفيل سالبة ؟

(أ) القوة المؤثرة على الفيل = - القوة المؤثرة على

الشخص ($F_1 = -F_2$) .

الحل

(ب) لكي يحدث الاتزان بين قوتين يشترط أن تكونا متساويتين فى المقدار ومتضادتين فى الاتجاه ، وخط عملهما واحد ، وتؤثران على نفس الجسم ، وتنطبق جميع هذه الشروط على قوى الفعل ورد الفعل ، فيما عدا الشرط الأخير ، حيث أن الفعل يؤثر على جسم (الفيل) ورد الفعل يؤثر على جسم آخر (الشخص) .

(ج) حساب العجلة التى يتحرك بها الفيل : ($F_1 = -F_2$) .

$$m_1 a_1 = -m_2 a_2 \Rightarrow \frac{-a_1}{a_2} = \frac{m_2}{m_1} \Rightarrow m_1 = 6m_2 \Rightarrow \frac{-a_1}{2} = \frac{1}{6} \Rightarrow a_1 = -\frac{1}{3} \text{ m/s}^2$$

تدل الإشارة السالبة على أن الفيل يتحرك فى عكس اتجاه حركة الشخص .

أسئلة الفصل الأول

س ١ : اكتب المصطلح العلمى لكل من :

١. الجسم الذى لا يتغير موضعه بالنسبة لنقطة ثابتة بمرور الزمن .
٢. الجسم الذى يغير موضعه بالنسبة لنقطة ثابتة بمرور الزمن .
٣. تغير موضع الجسم بالنسبة لجسم آخر بمرور الزمن .
٤. حركة تتميز بوجود نقطة بداية ونقطة نهاية .
٥. حركة تكرر نفسها على فترات زمنية متساوية .
٦. المسافة التى يقطعها الجسم فى وحدة الزمن وتعتبر من الكميات القياسية .
٧. الإزاحة التى يقطعها الجسم فى وحدة الزمن وتعتبر من الكميات المتجهة .
٨. السرعة التى يقطع فيها الجسم إزاحات متساوية فى أزمنة متساوية .
٩. السرعة التى يقطع فيها الجسم إزاحات متساوية فى أزمنة غير متساوية .
١٠. سرعة الجسم عند لحظة معينة .
١١. ميل مماس المنحنى عند لحظة معينة للعلاقة بين (الإزاحة — الزمن) لجسم يتحرك بسرعة غير منتظمة .
١٢. الإزاحة من نقطة البداية الى نقطة النهاية مقسومة على الزمن الكلى .
١٣. النسبة بين الإزاحة الكلية الى الزمن الكلى .
١٤. التغير فى سرعة الجسم خلال وحدة الزمن .
١٥. المعدل الزمني للتغير فى السرعة .
١٦. الحركة التى يحدث فيها تغير للسرعة بمرور الزمن .
١٧. العجلة التى يتحرك بها الجسم عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية فى أزمنة متساوية .
١٨. العجلة التى يتحرك بها الجسم عندما تتغير سرعته بمقادير غير متساوية فى أزمنة متساوية .
١٩. عجلة جسم تزداد سرعته بمرور الزمن ويكون اتجاهها فى نفس اتجاه السرعة .
٢٠. عجلة جسم تقل سرعته بمرور الزمن ويكون اتجاهها فى عكس اتجاه السرعة .
٢١. عجلة جسم يتحرك بسرعة ثابتة .
٢٢. سلسلة من الصور المتتابعة للجسم فى فترات زمنية متساوية مجمعة فى صورة واحدة .
٢٣. السرعة التى يمكن الاستدلال على قيمتها من قراءة مؤشر سرعة السيارة عند لحظة ما .
٢٤. توجد داخل السيارة لزيادة السرعة .
٢٥. توجد داخل السيارة لتقليل السرعة .
٢٦. توجد داخل السيارة لتغير اتجاه الحركة .
٢٧. العجلة التى يتحرك بها الجسم عندما تكون سرعته النهائية اكبر من سرعته الابتدائية .
٢٨. العجلة التى يتحرك بها الجسم عندما تكون سرعته النهائية اقل من سرعته الابتدائية .
٢٩. العجلة التى يتحرك بها الجسم عندما يبدأ حركته من السكون .
٣٠. العجلة التى يتحرك بها الجسم عندما يتوقف عن الحركة .

س ٢ : اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس

- (١) معادلة أبعاد العجلة $(L^{-2}T^{-2} - L^{-1}T^{-2} - LT^{-2}LT^{-1})$
- (٢) عندما يكون التغير فى سرعة جسم صفراً يكون
(عجلة حركته موجبة — عجلة حركته سالبة — عجلة حركته صفراً - الجسم ساكناً)
- (٣) إذا كان اتجاهي السرعة والعجلة سالبين
(تزداد سرعة الجسم — تتناقص سرعة الجسم — يتحرك الجسم بسرعة ثابتة — يتوقف الجسم عن الحركة)

- (٤) الحركة التى لها نقطة بداية ونقطة نهاية (دورية — انتقالية — اهتزازية — ترددية)
- (٥) كل مما يأتى يمثل حركة دورية عدا حركة (القطار — الأرض — الأرجوحة — بندول الساعة)
- (٦) ميل الخط المستقيم المار بنقطة الأصل والذى يمثل العلاقة بين الإزاحة (x) على المحور الرأسى والزمن (t) على المحور الأفقى (سرعة منتظمة — سرعة متغيرة — عجلة متغيرة)
- (٧) عندما يقطع الجسم إزاحات متساوية فى أزمنة متساوية فإن العجلة تكون ... (موجبة — سالبة — صفرية)
- (٨) الحركة فى خط مستقيم حركة (دورية — انتقالية — اهتزازية — ترددية)
- (٩) من أمثلة الحركة الدورية حركة (السيارات فى المنحنيات — الأقمار حول الكواكب — المقذوفات — كرة على مستوى مائل)
- (١٠) حركة فرع الشوكة الرنانة فى حالة اهتزازها تسمى حركة (انتقالية — متجهة — دورية — مقذوفات)
- (١١) المعدل الزمني للتغير فى الإزاحة هو (السرعة المتوسطة — العجلة اللحظية — العجلة المتوسطة — السرعة اللحظية)
- (١٢) تعتبر m/s وحدة قياس (الإزاحة × الزمن — السرعة × الزمن — الإزاحة لكل وحدة زمن — السرعة لكل وحدة زمن)
- (١٣) إذا تحركت سيارة فى خط مستقيم لقطع مسافة 300m خلال دقيقة تكون السرعة المتوسطة للسيارة (5-240-360-300)
- (١٤) المعدل الزمني للتغير فى الإزاحة عند لحظة معينة هي (السرعة المتوسطة — العجلة اللحظية — العجلة المتوسطة — السرعة اللحظية)
- (١٥) النسبة بين الإزاحة الكلية الى الزمن الكلى هي السرعة (اللحظية — المتوسطة — العددية — المتغيرة)
- (١٦) المعدل الزمني للتغير فى السرعة هو (العجلة — القوة — السرعة المتغيرة — السرعة اللحظية)
- (١٧) العجلة كمية (متجهة وحدة قياسها m/s — قياسية وحدة قياسها m/s²)
- (١٨) استغرقت سيارة أربع ثواني لتصل سرعتها الى تسعة أمثال سرعتها الابتدائية فإن السيارة تحركت بعجلة قيمتها العددية تساوى (نصف — ضعف — ثلاثة أمثال — أربعة أمثال)
- (١٩) عند حركة جسم فى خط مستقيم بعجلة = صفر فإن سرعته النهائية (أكبر من — تساوى — أقل من)
- (٢٠) عندما يتحرك جسم بسرعة منتظمة فإن عجلته (تتضاعف — تقل للنصف — تساوى صفر)
- (٢١) عند حركة الجسم بعجلة سالبة (تتساوى السرعة اللحظية مع المتوسطة — تقل سرعة الجسم بمرور الزمن — تزيد سرعة الجسم بمرور الزمن — تنعدم الإزاحة)
- (٢٢) فى العجلة الموجبة تكون (السرعة الابتدائية اكبر من السرعة النهائية — السرعة الابتدائية أقل من السرعة النهائية)
- (٢٣) عندما تبدأ سيارة حركتها من السكون فإن كلاً مما يلى صحيحاً ما عدا (تزداد سرعتها تدريجياً — تتحرك بعجلة تزايدية — سرعتها الابتدائية أكبر من سرعتها النهائية)
- (٢٤) 18km/h تساوى m/s (52 — 25 — 1 — 5)
- (٢٥) النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية لجسم يتحرك بعجلة تناقصية (أكبر من الواحد - أقل من الواحد - تساوى الواحد)

س ٣ : ما المقصود بكل من

- | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| — الجسم الساكن . | — الجسم المتحرك . | — السرعة . | — الحركة . | — الحركة المعجلة . |
| — السرعة اللحظية . | — مخطط الحركة . | — الحركة . | — السرعة المتغيرة . | — العجلة المنتظمة . |
| — الحركة الانتقالية . | — السرعة المتجهة . | — السرعة المتغيرة . | — السرعة المتوسطة . | — الحركة الدورية . |
| — السرعة العددية . | — السرعة المنتظمة . | — السرعة المتوسطة . | — العجلة المتغيرة . | — العجلة الصفرية . |
| — العجلة . | — العجلة الموجبة . | — العجلة المتغيرة . | — العجلة السالبة . | — العجلة السالبة . |

س ٤ : ما معنى قولنا أن

- ١- جسم يقطع إزاحة 30m خلال 6s.
- ٢- سرعة دراجة 5m/s
- ٣- السرعة العددية لجسم 15m/s
- ٤- المعدل الزمني للتغير فى سرعة سيارة 2m/s².
- ٥- السرعة المتوسطة لقطار 52m/s.
- ٦- الترام يتحرك بعجلة منتظمة 60m/s² +.
- ٧- عجلة حركة جسم 12m/s².
- ٨- ترام يتحرك بعجلة تسارع 60m/s².
- ٩- ترام يتحرك بعجلة تزايدية 60m/s².
- ١٠- قطار يتحرك بعجلة تناقصية 30m/s².
- ١١- قطار يتحرك بعجلة تباطؤ 30m/s².
- ١٢- قطار يتحرك بعجلة متغيرة 30m/s².
- ١٣- قطار يتحرك بعجلة متغيرة 30m/s².

س ٥ : علل لما يأتى

١. قد تتساوى السرعة المتوسطة مع السرعة اللحظية.
٢. إذا تحرك جسم بسرعة منتظمة فإن العجلة = صفر.
٣. تعتبر حركة بندول الساعة حركة دورية بينما حركة القطار حركة انتقالية.
٤. قد تكون السرعة كمية قياسية فى بعض القياسات وقد تكون كمية متجهة فى قياسات أخرى.
٥. العجلة كمية متجهة.
٦. عندما يتحرك الجسم بعجلة فإن الشكل البياني الذى يمثل العلاقة (الإزاحة — الزمن) لا يكون خطأً مستقيماً.
٧. يمكن حساب العجلة من الرسم البياني للعلاقة (السرعة — الزمن).

س ٦ : اذكر شرطاً واحداً لكل مما يأتى :

- ١- جسم يتحرك بسرعة منتظمة.
- ٢- جسم يتحرك بعجلة منتظمة سالبة.
- ٣- جسم يتحرك بعجلة منتظمة موجبة.
- ٤- جسم يتحرك بعجلة = صفر.

س ٧ : قارن بين كل من :

١. الحركة الانتقالية والحركة الدورية (من حيث : التعريف — الأمثلة).
٢. السرعة العددية والسرعة المتجهة (من حيث : التعريف — النوع).
٣. السرعة المنتظمة والسرعة المتغيرة (من حيث : التعريف — التمثيل البياني).
٤. السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية (من حيث : التعريف — العلاقة الرياضية).
٥. السرعة المتوسطة والسرعة العددية المتوسطة (من حيث : التعريف — النوع — العلاقة الرياضية).
٦. السرعة والعجلة (من حيث : التعريف — وحدة القياس — معادلة الأبعاد — العلاقة الرياضية).
٧. العجلة المنتظمة والعجلة المتغيرة (من حيث : التعريف — التمثيل البياني).
٨. العجلة المنتظمة الموجبة والسالبة (من حيث : التعريف — الاتجاه — التمثيل البياني).
٩. الحركة والحركة المعجلة.
١٠. الحركة ومخطط الحركة.
١١. الجسم الساكن والجسم المتحرك.
١٢. حركة المقذوفات والحركة الاهتزازية.


س ٨ : ارسم العلاقة البيانية التى تعبر عن :

١. جسم ساكن باستخدام علاقة (إزاحة — زمن).
٢. جسم يتحرك بسرعة منتظمة باستخدام علاقة (إزاحة — زمن).
٣. جسم يتحرك بسرعة متغيرة باستخدام علاقة (إزاحة — زمن).
٤. جسم يتحرك بعجلة منتظمة موجبة باستخدام علاقة (سرعة — زمن).

٥. جسم يتحرك بعجلة منتظمة سالبة باستخدام علاقة (سرعة — زمن)
٦. جسم يتحرك بعجلة غير منتظمة موجبة باستخدام علاقة (سرعة — زمن)
٧. جسم يتحرك بعجلة غير منتظمة سالبة باستخدام علاقة (سرعة — زمن)

س ٩ : أسئلة متنوعة

١. إذا كانت عجلة الجسم تساوى صفراً ، فهل هذا يعنى أن سرعته تساوى صفراً ؟ أعط مثلاً .
٢. جسم يتحرك بسرعة متغيرة من الشرق الى الغرب فمتى يكون اتجاه العجلة من الشرق الى الغرب والعكس
٣. الشكل البياني التالى يوضح رحلة قامت بها سيارة ، لاحظ الشكل ثم اجب عم الأسئلة التالية :



- (أ) ما أكبر سرعة وصلت إليها السيارة .
- (ب) صف حركة السيارة فى الجزء PQ .
- (ج) صف حركة السيارة فى الجزء OR .
- (د) أى من النقاط P أو Q أو R تمثل أول المرحلة التى استخدمت فيها الفرامل ؟
٤. متى تتساوى عددياً القيم التالية ؟ (السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية — سرعة الجسم والمسافة التى يقطعها) .
٥. متى تتساوى القيم التالية مع الصفر ؟ (سرعة جسم — عجلة جسم متحرك) .
٦. تتدحرج الكرة عند دفعها ، ثم تتباطأ وتتوقف ، هل لسرعة الكرة وعجلتها الإشارة نفسها ؟ ولماذا ؟

س ١٠ : ١- مسائل كتاب المدرسة

- (١) احسب السرعة المتوسطة بوحدة km/h لمتسابق قطع مسافة 4000 m خلال 30 min ، ثم احسب المسافة التى يقطعها بعد 45 min من بدء السباق بالسرعة المتوسطة نفسها .
[8 km/h , 6 km]
- *****
- (٢) مثل النتائج الموضحة فى الجدول التالى ثم اوجد من الرسم
كلاً من العجلة والإزاحة بعد 12 s .

| | | | | |
|----------|-----|------|------|------|
| t (s) | 0 | 6 | 9 | 12 |
| v (m/s) | 8.1 | 36.9 | 51.3 | 65.7 |

س ١٠ : ٢- مسائل امتحانات

- (١) تتحرك سيارة على طريق مستقيم بسرعة منتظمة بحيث تعبر الكيلو 151 الساعة 8 صباحاً ثم تعبر الكيلو 316 الساعة 10 صباحاً . احسب السرعة التى تتحرك بها السيارة .
[22.92 m/s]
- *****
- (٢) قطعت سيارة 600 km فى زمن قدره 10h فكم تكون سرعتها المتوسطة ؟ وهل تختلف سرعتها اللحظية عن سرعتها المتوسطة ؟ ولماذا ؟
[16.67 m/s]
- *****

(٣) فى مباراة لكرة القدم وقع أبو تريكة الكرة فى احد أركان الملعب على بعد 50m من محمد صلاح وكانت أقصى سرعه له 3m/s وكان هناك عبد الشافي على بعد 35m من الكرة ويستطيع أن يجرى بسرعة 2m/s . أى اللاعبين يلحق بالكرة ؟
[محمد صلاح]

(٤) أيهما يتحرك بسرعة أكبر ؟ سيارة تحرك بسرعة 80km/h أم دراجة تتحرك بسرعة 8m/s ؟

(٥) تزداد سرعة سيارة بانتظام من 36km/h الى 108km/h خلال 20s احسب السرعة المتوسطة والعجلة .

(٦) تحركت سيارة فى خط مستقيم لتقطع 60m خلال الثانية الأولى ثم 80m خلال الثانية التالية ثم 100m خلال الثانية الثالثة ، احسب سرعة السيارة فى كل حالة والسرعة المتوسطة للسيارة .

(٧) جسم يتحرك بسرعة منتظمة 180km/h احسب المسافة التى يقطعها خلال دقيقة .

(٨) تتحرك سيارة من السكون لتصل سرعتها الى 90km/h خلال 10s ، احسب العجلة التى تتحرك بها السيارة .

[2.5 m/s²]


| | | | | | |
|-------|---|---|----|---|----|
| d (m) | 4 | 8 | 12 | A | 20 |
| t (s) | 2 | 4 | 6 | 8 | B |

(٩) تحرك جسم فى خط مستقيم بسرعة منتظمة وسجلت المسافة التى قطعها هذا الجسم فى أزمنة مختلفة كما بالجدول المقابل احسب سرعة الجسم وقيمة كل من A , B

(١٠) أتوبيس متحرك فى خط مستقيم ، وتتغير سرعته من 6m/s الى 12m/s خلال فترة 3s ، ما مقدار العجلة ؟

(١١) عند تشغيل قارب ساكن وصلت سرعته الى 2.5 m/s خلال فترة زمنية مقدارها 30s اوجد مقدار العجلة التى يتحرك بها القارب ونوع العجلة مع ذكر السبب .

(١٢) من الشكل المقابل احسب



(أ) المسافة الكلية .

(ب) الإزاحة .

(ج) السرعة خلال الخمس ثواني الأولى .

[20 m , 0 , 2 m/s]

| | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|
| d (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| t (s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(١٣) الجدول المقابل يوضح العلاقة بين الإزاحة والزمن لجسم متحرك ، ارسم العلاقة بين الإزاحة d على المحور الرأسى والزمن t على المحور الأفقى ومن الرسم احسب السرعة وما نوعها ؟

| | | | | | | |
|---------|---|----|----|----|---|----|
| V (m/s) | 5 | 10 | 20 | 30 | A | 40 |
| t (s) | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |

(١٤) الجدول المقابل يوضح العلاقة بين السرعة والزمن لجسم متحرك ، ارسم العلاقة بين السرعة V على المحور الرأسى و الزمن t على المحور الأفقى ومن الرسم احسب .

١- قيمة A .

٢- سرعة الجسم عند زمن قدره 5s .

٣- العجلة ، وحدد نوعها .


أسئلة الفصل الثانى

س ١ : أكتب المصطلح العلمى لكل من :

- ١- الأجسام ذات الكتل الكبيرة تصل الى سطح الأرض فى زمن أقل من الأجسام ذات الكتل الصغيرة .
- ٢- العجلة المنتظمة التى تتحرك بها الأجسام أثناء سقوطها سقوطاً حراً نحو سطح الأرض .
- ٣- اثبت انه مهما اختلفت كتل الأشياء فان جميعها تصل الى سطح الأرض فى وقت واحد وذلك فى حالة إهمال مقاومة الهواء .

س ٢ : اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس

- ١- جسمان لهما نفس الحجم فى مادتين مختلفتين يسقطان معاً سقوطاً حراً من نفس الارتفاع ، ما العبارة الصحيحة التى تصف وصولهما الى الأرض ؟
 - يصل الجسم الأثقل أولاً .
 - يصل الجسمان معاً الى الأرض .
 - عجلة حركة الجسم أكبر .
 - عند قذف جسم بسرعة ابتدائية V_i فى اتجاه يميل بزاوية 60° على الاتجاه الأفقى ، فانه يصل الى مسافة أفقية R ولكي يصل الجسم الى مسافة أبعد علينا قذفه بنفس السرعة بزاوية ($30^\circ - 45^\circ - 75^\circ - 90^\circ$) .
- ٢- الشكل البياني الذى يمثل جسماً قذف رأسياً الى أعلى ، ثم عاد الى نقطة القذف مع اعتبار اتجاه السرعة الابتدائية اتجاهها موجباً هو الشكل



- ٤- الوحدة m/s^2 تستخدم لقياس معدل التغير فى (الإزاحة — السرعة — العجلة — المسافة)
- ٥- إذا قذف جسم لأعلى فأى الكميات الفيزيائية تساوى صفراً عند أقصى ارتفاع (قوة الجاذبية الأرضية — العجلة — طاقة الوضع — السرعة)
- ٦- عند سقوط جسم سقوطاً حراً تتغير من نقطة لأخرى . (كتلته — سرعته — عجلته — حركته)
- ٧- يصل الجسم الى أقصى مدى أفقى عند قذفه لأعلى بزاوية ($10^\circ - 45^\circ - 75^\circ - 90^\circ$)
- ٨- قذفت كرتان الى أعلى إحداها بسرعة ابتدائية تعادل ضعف السرعة الابتدائية للكرة الأخرى فان الكرة المقذوفة بسرعة أكبر تصل الى ارتفاع (ضعف الأخرى — أربع أمثال الأخرى — $\sqrt{2}$ من الأخرى)
- ٩- إذا قذف جسم بزاوية تصنع مع الأفقى 70° وقذف جسم آخر بزاوية 20° يكون المدى الأفقى للجسم (الأول < من الثانى / الأول = الثانى / الأول > الثانى)
- ١٠- فى السقوط الحر بتضاعف كتلة الجسم (تتضاعف العجلة — تظل ثابتة — تقل العجلة للنصف)
- ١١- أقصى قيمة لعجلة الجاذبية الأرضية تكون عند (مركز الأرض — سطح الأرض — خارج مجال الجاذبية الأرضية)
- ١٢- زمن وصول جسم لأقصى ارتفاع زمن عودته لسطح الأرض (أكبر من — يساوى — أقل من)
- ١٣- عند قذف جسم رأسياً الى أعلى فانه يتحرك بعجلة (صفرية — تزايدية — تناقصية)

- ١٤- الكمية التى لا تتغير قيمتها أثناء السقوط الحر
 ١٥- عندما يسقط جسم سقوطاً حراً فان.....
 (الجسم يبدأ حركته بسرعة صغيرة — تزداد سرعته بمعدل ثابت — سرعة تصل أقصاها لحظة اصطدامه بالأرض)
 ١٦- عند قذف جسم رأسياً الى أعلى ، فإنه يتحرك بعجلة (منتظمة موجبة — منتظمة سالبة — تساوى صفر)
 ١٧- جسمان كتلة كلاً منهما 2 kg , 4 kg تركا ليسقطا سقوطاً حراً نحو الأرض فإذا كانت العجلة التى يسقط بها الأول 10 m/s² تكون العجلة التى يسقط بها الجسم الثانى (20 m/s² — 10 m/s² — 5 m/s²)
 ١٨- بدأ راكب دراجة حركته من السكون بعجلة منتظمة 1.5 m/s² فوصلت سرعته الى 7.5 m/s خلال مسافة قدرها (1875 m — 187.5 m — 18.75 m — 11.25 m)
 ١٩- عندما يبدأ جسم حركته من السكون ويتحرك بعجلة منتظمة تكون سرعته النهائية V_f تساوى
 $(V_i - at) / (a t) / (1/2 at^2 - d t)$
 ٢٠- يتحرك جسم من السكون بعجلة منتظمة 2 m/s² ليقطع مسافة 100 m فى زمن قدره s
 (20 — 10 — 5 — 2.5)
 ٢١- إذا بدأ جسم حركته من السكون واستغرق زمن (t) يساوى عددياً قيمة عجلته (a) ليصل لسرعة 16 m/s فان قيمة عجلته تحركه m/s²
 (16 — 8 — 4 — 2)
 ٢٢- ميل الخط المستقيم للعلاقة البيانية (الإزاحة — مربع السرعة) لجسم بدا حركته من السكون يساوى
 (2a — a/2 — V² — V/2)
 ٢٣- عند قذف جسم رأسياً الى أعلى ، فان زمن الصعود لأعلى يكون من الهبوط الى أسفل
 (ضعف — أكبر من — مساوي — اصغر من)
 ٢٤- عند قذف جسم رأسياً الى أعلى فان
 $(V_i = V_f / V_i = 0 / V_f = 0 / V_f + V_i = 0)$
 ٢٥- عندما يسقط جسم سقوطاً حراً تحت تأثير الجاذبية فإنه يتحرك
 (بسرعة منتظمة — بعجلة سالبة — بعجلة ثابتة 9.8m/s² — بعجلة تساوى صفر)
 ٢٦- جسم يسقط جسم سقوطاً حراً تحت تأثير الجاذبية فان المسافة المقطوعة تتناسب
 (طردياً مع الزمن — عكسياً مع الزمن — طردياً مع ضعف الزمن — طردياً مع مربع الزمن)
 ٢٧- جسم يسقط سقوطاً حراً فتكون سرعته بعد ثانيتين m/s (g = 9.8m/s²)
 (4 — 4.9 — 19.6 — 25)
 ٢٨- ميل الخط المستقيم للعلاقة البيانية (المسافة — مربع الزمن) لجسم يسقط سقوطاً حراً يساوى عجلة السقوط الحر
 (ضعف — جذر — نصف — ربع)
 ٢٩- تتساوى قيمة المسافة الأفقية التى يقطعها مقذوفين متماثلين بنفس السرعة عندما تكون زوايا قذفهما
 (٤٠°، ٥٠° / ٦٠°، ٨٠° / ٨٠°، ٣٠°)
 ٣٠- جسمان يسقطان نحو الأرض سقوطاً حراً ، كتلة الأول ضعف كتلة الثانى ، فان النسبة بين $a_1 : a_2$ =
 (1 : 2 / 2 : 3 / 1 : 1 / 2 : 1)

س ٣ : متى تساوى القيم الآتية صفرا

- ١- السرعة الابتدائية لجسم .
 ٢- السرعة النهائية لجسم .
 ٣- سرعة جسم مقذوف لأعلى .
 ٤- السرعة الأفقية لجسم مقذوف (لحظة بدء الحركة)
 ٥- المدى الأفقى لجسم مقذوف لأعلى .

س ٤ : علل لما يأتى

- ١- عند سقوط جسم من سكون سقوطاً حراً تزداد سرعته .
 ٢- تقل سرعة الجسم المقذوف رأسياً الى أعلى حتى تصل الى الصفر .
 ٣- المدى الأفقى لجسم مقذوف بزواوية ٣٠° هو نفس المدى الأفقى لجسم مقذوف بزواوية ٦٠° عند قذفهما بنفس السرعة .

- ٤- عندما يقذف جسم رأسياً الى أعلى فإنه يصل لأقصى ارتفاع له ثم يتردد ليصل الى نقطة القذف بنفس السرعة التى قذف بها .
- ٥- تختلف قيمة الجاذبية اختلافاً طفيفاً من مكان لآخر على سطح الأرض .
- ٦- عجلة جسم يقذف لأعلى عند أقصى ارتفاع لا تساوى الصفر .
- ٧- قد تكون عجلة السقوط الحر موجبة وقد تكون سالبة .

س ٥ : متى يتساوى كل من

- ١- السرعة الابتدائية والنهائية لجسم .
- ٢- السرعة النهائية لجسم بدأ حركته من السكون مع عجلة تحركه .
- ٣- السرعة النهائية لجسم بدأ حركته من السكون مع زمن حركته .
- ٤- السرعة الأفقية والرأسية لمقذوف .
- ٥- المدى الأفقى لجسمين مقذوفين بزاويتين مختلفتين وسرعة واحدة .

س ٦ : اثبت أن

$$V_f = V_i + at \quad (١)$$

$$d = V_i t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (٢)$$


$$V_f^2 + V_i^2 = 2 a d \quad (٣)$$

س ٧ : ماذا يحدث فى الحالات الآتية

- ١- إذا ضغط سائق على فرامل سيارة متحركة (بالنسبة لقيمة العجلة والسرعة النهائية) .
- ٢- قذف جسم رأسياً الى أعلى (بالنسبة لسرعته) .
- ٣- سقوط جسم من برج نحو الأرض .
- ٤- سقوط جسمين مختلفين فى الكتلة فى نفس اللحظة ومن نفس الارتفاع (مع إهمال مقاومة الهواء) .

س ٨ : أسئلة متنوعة




- ١- تحركت سيارة فى خط مستقيم ، وسجلت سرعتها خلال 30 ثانية ، ثم مثلت بيانياً فى الشكل المقابل . قم بالمشاركة مع زميل بتحليل الشكل البياني الذى يمثل حركة السيارة ، واستخلاص المعلومات اللازمة لإكمال الجدول التالى :



| المرحلة CD | المرحلة BC | المرحلة AB | مراحل حركة السيارة |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | السرعة الابتدائية V_i |
| | | | السرعة النهائية V_f |
| | | | التغير فى سرعة السيارة ΔV |
| | | | زمن المرحلة t |
| | | | قيمة العجلة a |
| | | | وصف الحركة أثناء المرحلة |

- ٢- ما معنى قولنا أن عجلة السقوط الحر $= 9.8 \text{ m/s}^2$.
- ٣- اكتب ما تؤول إليه معادلات الحركة بفرض أن الجسم (بدأ حركته من السكون — توقف عن الحركة)
- ٤- استنتج المعادلة الثانية من معادلات الحركة بيانياً .

٥- أكتب العلاقة الرياضية وما يساويه الميل لكل من الأشكال البيانية التالية :





٦- ابيّن الشكل كرة تنزلق على سطح أملس بعجلة ثابتة ، وتبين النقاط (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د) موقع الجسم كل 0.5 s ،

اعتماداً على الشكل اجب عما يأتى

(أ) كيف تستدل من الشكل على أن سرعة الكرة تزداد ؟

(ب) لماذا تزداد السرعة ؟

(ج) احسب عجلة الكرة إذا علمت أن المسافة من (أ) الى (د) تساوى 2m .



٧- من الرسم البياني المقابل

(أ) صف حالة الجسم .

(ب) ماذا تمثل كل من النقطتين A ، C ؟ وما العلاقة بينهما ؟

(ج) ماذا تمثل النقطة B ؟

س ٩ : ١- مسائل للتدريب

(١) بدأ جسم حركته من السكون فوصلت سرعته الى 20 m/s خلال 5 s احسب :

(أ) العجلة التى يتحرك بها الجسم .

(ب) المسافة المقطوعة خلال هذه المدة .

(٢) دراجة سباق بدأت من السكون وبعد 10 s اكتسبت سرعة مقدارها 30 m/s احسب :

(أ) العجلة التى تحركت بها .

(ب) المسافة التى قطعها .

(٣) بدأ قطار يتحرك من سكون بعجلة منتظمة لمدة 50 s حيث بلغت سرعته 25 m/s احسب

(أ) العجلة ..

(ب) المسافة التى قطعها القطار .

(٤) بدأ جسم الحركة من سكون بعجلة 8 m/s² فقطع مسافة 400 m احسب :

(أ) السرعة النهائية .

(ب) الزمن الذى استغرقته .

(٥) بدأت سيارة تتحرك من السكون وبعد 50 s اكتسبت سرعة قدرها 300 m/s فأوجد :

(أ) العجلة التى تحركت بها السيارة .

(ب) المسافة التى قطعها

(٦) أراد سائق سيارة أن يتجاوز سيارة أمامه فزاد من سرعة سيارته بانتظام من 70 m/s الى 100 m/s خلال 20s

احسب : (أ) العجلة المنتظمة للسيارة .

(ب) المسافة التى قطعها السيارة .

(٧) جسم يتحرك بسرعة 20 m/s بعجلة تزايدية 5 m/s² احسب :

(أ) سرعته بعد 4 s

(ب) المسافة التى يقطعها الجسم خلال هذه الفترة .

(٨) جسم يتحرك بسرعة ابتدائية 16 m/s يلزمه زمن قدره 32 s ليتوقف تماماً عن الحركة احسب :

(أ) العجلة التى يتحرك بها ونوعها .

(ب) المسافة التى يتحركها حتى يتوقف .

(٩) تسير سيارة بسرعة 20 m/s أخذت تتباطأ بانتظام حتى توقفت خلال مسافة 80 m ، اوجد مقدار العجلة ، ثم احسب الزمن الذى استغرقتة عملية التوقف .

(١٠) قطار يتحرك بسرعة 30 m/s بعجلة تناقصية 3 m/s^2 عند استخدام الفرامل اوجد الزمن اللازم لتوقف القطار والمسافة التى يقطعها منذ استخدام الفرامل حتى يتوقف .

(١١) بدأ قائد سيارة الضغط على الفرامل لحظة أن كانت سرعتها 20 m/s وتمكن من إيقافها بعد 4 s احسب العجلة والمسافة التى قطعها السيارة .

(١٢) مترو أنفاق يتحرك بسرعة 45 m/s فإذا كانت العجلة التى يحدثها جهاز الفرامل لإيقاف المترو 15 m/s^2 ، احسب أقصر مسافة يمكن للمترو أن يقف خلالها وكذلك الزمن الذى استغرقتة عملية التوقف .

(١٣) بدأ جسم حركته من السكون وتحرك بعجلة 2 m/s^2 لمدة 10 s احسب سرعته النهائية والمسافة التى قطعها .

(١٤) رصاصة تتحرك فى مسار أفقى بسرعة 20 m/s صدمت هدف فغاصت مسافة قدرها 10 m حتى سكنت داخل الهدف ، احسب العجلة التى تتحرك بها الرصاصة وبين نوعها .

(١٥) شاهد سائق سيارة الإشارة حمراء على بعد 100 m وكانت سرعة السيارة 80 km/hr فضغط على الفرامل فتحركات السيارة بعجلة سالبة 2 m/s^2 ، هل يتخطى السائق الإشارة ؟ احسب الزمن اللازم حتى تتوقف السيارة . [يتخطى] 11.11 s

(١٦) تمكن قائد قطار من استخدام كابح السرعة (الفرامل) عندما كانت سرعة القطار 20 m/s وتوقف القطار بعد دقيقة من استخدام الفرامل ، احسب العجلة والمسافة المقطوعة . [$-1/3 \text{ m/s}^2$, 600 m]

(١٧) بدأ نمر الجري عندما رأى غزالة تبعد عنه 15 m وكانت تجرى بسرعة منتظمة 2 m/s إذا علمت أن النمر يجرى بعجلة منتظمة موجبة 2 m/s^2 ، متى وعلى أى بعد يتمكن النمر من الغزالة . [من بدء الحركة 25 m , 5 s]

(١٨) بدأ جسم حركته من السكون عند النقطة A عندما كانت الساعة العاشرة ، بعجلة منتظمة 2 m/s^2 قاصداً النقطة B على بعد 500 m من النقطة A وبعد مضي 10 s تحرك جسم آخر من النقطة B قاصداً A بسرعة منظمة 10 m/s فمتى يتقابل الجسمان ؟ [20 s]

(١٩) يتحرك جسم طبقاً للعلاقة $V_f = 4t$ ، اوجد سرعته النهائية عندما يقطع مسافة قدرها 18 m . [12 m/s]

(٢٠) يتحرك جسم طبقاً للعلاقة التالية $d = 15t + 3t^2$ ، احسب السرعة الابتدائية للجسم والعجلة التى يتحرك بها الجسم والمسافة المقطوعة خلال 4 s والزمن الذى يمضى حتى يسكن الجسم إذا تحرك بنفس العجلة .

(٢١) يتحرك جسم طبقاً للعلاقة التالية $d = 16t - (1.5)t^2$ ، احسب السرعة الابتدائية للجسم والعجلة المنتظمة التى يتحرك بها الجسم والزمن الذى يمضى حتى يتوقف الجسم عندما يتحرك بنفس العجلة وسرعة الجسم بعد ان يقطع مسافة قدرها 4 m . [16 m/s , -3 m/s^2 , 5.33 s , 15.23 m/s]

(٢٢) يتحرك جسم فى خط مستقيم طبقاً للعلاقة $V_f = \sqrt{64 - 8d}$ ، احسب السرعة الابتدائية للجسم والمسافة التى يقطعها حتى يتوقف تماماً عن الحركة والسرعة بعد 5 s من بدء الحركة .

(٢٣) يتحرك جسم فى خط مستقيم طبقاً للعلاقة $V_f = \sqrt{81 + 5d}$ ، احسب السرعة الابتدائية للجسم والعجلة التى يتحرك بها الجسم والمسافة المقطوعة خلال 10 s .

- (٢٤) جسم يتحرك فى خط مستقيم طبقاً للعلاقة $V = 2\sqrt{d}$ احسب سرعة هذا الجسم بعد زمن قده s 2 من بدء الحركة

- (٢٥) يتحرك جسم فى خط مستقيم طبقاً للعلاقة $V_f = 4\sqrt{d + 25}$ ، احسب العجلة التى يتحرك بها الجسم والمسافة المقطوعة خلال $4s$

- (٢٦) فى تجربة لتعيين عجلة الجاذبية الأرضية باستخدام قطرات ماء تسقط سقوطاً حراً كانت المسافة بين مصدر قطرات الماء و سطح الإناء $1m$ وكان زمن سقوط أو ارتطام 200 قطرة متتالية هو s 90 . احسب عجلة الجاذبية الأرضية .
[9.88 m/s^2]

- (٢٧) قذف جسم رأسياً الى أعلى بسرعة ابتدائية 100 m/s حيث أن عجلة الجاذبية ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) أوجد أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم والزمن الذى يستغرقه للوصول الى هذا الارتفاع .

- (٢٨) سقط جسم سقوطاً حراً فى مجال الجاذبية الأرضية من ارتفاع 100 m فوق سطح الأرض فإذا كانت عجلة الجاذبية الأرضية ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) احسب سرعة الجسم لحظة وصوله للأرض وزمن وصول الجسم للأرض .

- (٢٩) قذف جسم رأسياً لأعلى فكان أقصى ارتفاع وصل إليه 320 m فإذا كانت عجلة السقوط الحر 10 m/s^2 اوجد السرعة التى قذف بها ، وكذلك زمن وصوله لأقصى ارتفاع .

- (٣٠) قذف جسم رأسياً لأعلى بسرعة ابتدائية 98 m/s احسب أقصى ارتفاع يصل إليه وزمن أقصى ارتفاع .

- (٣١) جسم يسقط سقوطاً حراً احسب المسافة المقطوعة خلال s 10 وسرعته عندما يقطع مسافة 490 m والزمن اللازم للوصول لسرعة 196 m/s ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) .

- (٣٢) اسقط حجر من قمة مبنى فوصل للأرض بعد s 2 فإذا كانت ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) احسب السرعة التى يصل بها للأرض وارتفاع المبنى .

- (٣٣) سقط جسم من أعلى مبنى فوصل للأرض بعد s 4 وكانت سرعته لحظة وصوله للأرض 39.2 m/s اوجد ارتفاع المبنى وزمن وصوله للأرض ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) .

- (٣٤) ترك جسم ليسقط من ارتفاع مبنى فوصل للأرض بعد $6s$ احسب سرعة الجسم بعد $3s$ وارتفاع المبنى . ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

- (٣٥) ترك جسم يسقط من أعلى مبنى فوصل للأرض بعد s 50 اوجد سرعته عند اصطدامه بالأرض واحسب ارتفاع المبنى ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) .

- (٣٦) قذف حجر صغير فى بئر بسرعة 2 m/s فوصل بعد s 3 احسب سرعة الحجر عند اصطدامه بقاع البئر وعمق البئر ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) .

- (٣٧) قذف جسم رأسياً لأعلى فعاد الى النقطة التى قذف منها بعد $20s$ من لحظة القذف احسب السرعة التى قذف بها وأقصى ارتفاع يصل إليه . ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

- (٣٨) قذفت كرة رأسياً لأعلى من نقطة فعادت لنفس النقطة بعد $4s$ من لحظة القذف . احسب السرعة الابتدائية وأقصى ارتفاع تصل إليه . ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

(٣٩) وضع جسمان كتلتهما 5kg , 25 kg فى مكان مرتفع يبعد عن سطح الأرض 10m ثم بدأ الجسمان فى السقوط الحر فى نفس اللحظة ، أى الجسمان يصل الى الأرض أولاً ؟ بفرض إهمال مقاومة الهواء ، ثم احسب زمن وصول كل منهما الى الأرض .
[1.43 s]

(٤٠) قذف جسم لأعلى بسرعة 20 m/s بزاوية ميل 60° مع الأفقى ، احسب سرعة الجسم الأفقية لحظة القذف وسرعة الجسم الرأسية لحظة القذف ، سرعة الجسم الرأسية بعد 1s .
[10 m/s , 17.32m/s , 7.32 m/s]

(٤١) قام شخص بقذف حجر لأعلى بزاوية ميل 30° وعاد الجسم لنفس المستوى بعد 10 s فإذا علمت أن $g = 10 \text{ m/s}^2$ ، احسب سرعة الجسم لحظة قذفه فى الاتجاه الرأسى ، وسرعة الجسم لحظة قذفه فى الاتجاه الأفقى ، وأقصى ارتفاع يصل له الجسم .
[50 m/s , 86.6 m/s , 125 m]

(٤٢) يقوم ضابط بضبط مدفع فى مهمة تدريبية :

- ما الزاوية التى تحقق أقصى مدى أفقى للقذيفة ؟

- ما سرعة القذيفة المنطلقة إذا وصلت لارتفاع 2000m عندما تكون زاوية الميل 60° مع الأفقى ؟

- إذا كانت سرعة القذيفة لحظة الانطلاق هى 800 m/s فما سرعتها بعد 10 s إذا كان المدفع يميل على الرأسى بزاوية 10° .
[450 , 230.9 m/s , 701.7 m/s]

(٤٣) قذف جسم لأعلى وكانت زاوية ميله مع المحور الرأسى هى 45° وسرعته الأفقية هى 50 m/s احسب سرعته الرأسية لحظة القذف سرعته بعد ثانيتين من لحظة القذف ، والمسافة الأفقية التى يقطعها الجسم .

(٤٤) مدفعان متماثلان تماماً تنطلق منهما القذيفة بسرعة 900 m/s ولكن احدهما يميل بزاوية 30° مع الأفقى والثاني يميل بزاوية 30° مع الرأسى فأيهما له مدى أفقى اكبر ؟

(٤٥) جسم يقذف لأعلى كما بالشكل ، احسب :

- سرعة الجسم الأفقية لحظة القذف .

- سرعة الجسم الرأسية عند النقطة A , B .

- زمن تحليق الجسم .

- المسافة AC .

[17.32m/s , 10m/s , 0 , 2s , 5m , 34.64 m]

س ٩ : ٢- مسائل الكتاب المدرسى

(١) وقف شخص أعلى مبنى مرتفع وقذف كرة بسرعة 50 m/s ، فإذا كانت عجلة السقوط الحر تساوى 10 m/s^2 ، احسب سرعة الكرة والإزاحة الرأسية التى تقطعها بعد مرور 4 s ، فى الحالات الآتية :

(أ) إذا قذفت الكرة لأعلى فى الاتجاه الرأسى .

(ب) إذا قذفت الكرة لأسفل فى الاتجاه الرأسى .

(ج) إذا قذفت الكرة لأعلى بزاوية مقدارها 60° مع المستوى الأفقى .

(د) إذا قذفت الكرة أفقياً (الزاوية مقدارها صفر مع المستوى الأفقى) .

[10m/s , 120m , 90m/s , 280m , 25.22 m/s , 93.2m , 64.03m/s , 80m]


(٢) الرسم البياني المقابل يعبر عن تغير مركبة السرعة العمودية لجسم مقذوف فى

مجال جاذبية الأرض إذا كانت زاوية القذف 30° ، فاحسب :

(أ) مقدار السرعة التى قذف بها الجسم .

(ب) أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم .

(ج) المدى الأفقى للجسم . [60m/s , 45m , 311.77m]



| | | | | |
|---------|---|----|----|----|
| t (s) | 0 | 6 | 9 | 12 |
| V (m/s) | 9 | 37 | 51 | 65 |

(٣) الجدول المقابل يوضح العلاقة بين الزمن والسرعة : ارسم العلاقة البيانية بين السرعة V على المحور الرأسى والزمن t على المحور الأفقى ومن الرسم أوجد قيمة العجلة التى يتحرك بها الجسم والإزاحة بعد 12s .

[$14/3 \text{ m/s}^2$, 444 m]

(٤) احسب الزمن الذى تستغرقه طائرة لتتوقف تماماً عند هبوطها على مدرج المطار إذا علمت أن سرعتها عند ملامتها لأرض الممر 45 m/s ثم تبطئها بمعدل منتظم 0.5 m/s^2 .

[90 s]

س ٩ : ٣- مسائل من امتحانات المدارس

(١) بدأ جسم حركته من السكون وتحرك بعجلة 3 m/s^2 لمدة 20 s احسب سرعته النهائية والمسافة التى قطعها .

[60 m/s , 600 m]

(٢) تتحرك سيارة بسرعة 30 m/s وعندما ضغط السائق على الفرامل توقفت السيارة بعد 15 s احسب :


(أ) العجلة التى تتحرك بها السيارة قبل الضغط على الفرامل .

(ب) العجلة التى تتحرك بها السيارة بعد الضغط على الفرامل .

(ج) المسافة التى تقطعها حتى تتوقف .

[0 , -2 m/s^2 , 255 m]

(٣) قذف جسم رأسياً الى أعلى فوصل الى ارتفاع 5 s . احسب سرعته الابتدائية . ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) [49 m/s]



(٤) من الشكل المقابل :

احسب السرعة التى يجب أن تنطلق بها القذيفة من فوهة المدفع

لكى تصيب السفينة ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

[158.1 m/s]

(٥) يتحرك جسم فى خط مستقيم طبقاً للعلاقة $V_f = \sqrt{36 + 6d}$ ، احسب :

- السرعة الابتدائية للجسم .

- العجلة التى يتحرك بها الجسم وما نوعها .

- المسافة المقطوعة خلال 10 s .

- سرعة الجسم بعد 15 s .

[6 m/s , 3 m/s^2 , 210m , 60.67 m , 51 m/s]

(٦) يتحرك جسم طبقاً للعلاقة $V_f = \frac{1}{2} V_f - 6$ ، احسب :

- السرعة الابتدائية للجسم .

- العجلة التى يتحرك بها الجسم .

[12 m/s , 2 m/s^2 , 220m]

(٧) قذف جسم لأعلى فى خط مستقيم ثم عاد الى مكان قذفه بعد 4s ، احسب :

- السرعة التى قذف بها

- أقصى ارتفاع يصل إليه

[19.6 m/s , 19,6 m]

($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

| | | | | |
|-------|---|----|----|----|
| t (s) | 0 | 2 | 4 | 6 |
| d (m) | 0 | 10 | 40 | 90 |

(٨) الجدول المقابل يوضح العلاقة بين الزمن والمسافة : ارسم العلاقة البيانية بين

الإزاحة d على المحور الرأسى و مربع الزمن t^2 على المحور الأفقى ومن

الرسم أوجد قيمة العجلة التى يتحرك بها الجسم .

[5 m/s^2]

أسئلة الفصل الثالث

س ١ : اكتب المصطلح العلمى

- (١) ميل الجسم الساكن الى البقاء فى حالة السكون وميل الجسم المتحرك للاستمرار فى الحركة بسرعه الأصلية .
- (٢) خاصية مقاومة الأجسام لتغيير حالتها من السكون أو الحركة .
- (٣) مقدار القوة التى إذا أثرت على جسم كتلته 1 kg أكسبته عجلة مقدارها 1 m/s^2 .
- (٤) مقدار ممانعة الجسم لأى تغيير فى حالته الحركية الانتقالية .
- (٥) لكل فعل رد فعل مساو له فى المقدار ومضاد له فى الاتجاه .
- (٦) مؤثر خارجي يؤثر على الجسم فيسبب تغير حالته أو اتجاهه .
- (٧) يظل الجسم على حالته من سكون أو حركة منتظمة فى خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة محصلة تغير من حالته
- (٨) إذا أثرت قوة محصلة على جسم أكسبته عجلة تتناسب طردياً مع القوة المؤثرة على الجسم وعكسياً مع كتلته .
- (٩) قوة جذب الأرض للجسم .
- (١٠) عندما يؤثر جسم على جسم آخر بقوة فإن الجسم الثانى يؤثر على الجسم الأول بقوة مساوية لها فى المقدار .
- (١١) كمية متجهة تقدر بحاصل ضرب كتلة الجسم فى سرعته .
- (١٢) القوة المحصلة المؤثرة على جسم تساوى المعدل الزمني للتغير فى كمية تحرك هذا الجسم .

س ٢ : اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) تسير دراجة بسرعة ثابتة فى خط مستقيم فى اتجاه الشرق ، عندما تكون القوة المحصلة على الدراجة
(صفراً — سالبة — موجبة — فى اتجاه الشرق)
- (٢) عندما يكون اتجاه العجلة عكس اتجاه السرعة
(تقل القوة المحصلة — تزداد سرعة الجسم — تظل سرعة الجسم ثابتة — تتناقص سرعة الجسم)
- (٣) عندما تكون القوة المحصلة المؤثرة على سيارة متحركة = صفراً ،
(تتحرك السيارة بعجلة موجبة — تتحرك السيارة بعجلة سالبة — تتحرك السيارة بعجلة منتظمة — تتوقف السيارة)
- (٤) يتحرك الجسم بعجلة منتظمة عندما :
(— يقطع مسافات متساوية فى أزمنة متساوية . — تتناقص سرعته بمقادير متساوية فى أزمنة متساوية .
— تزداد سرعته بمقادير متساوية فى أزمنة غير متساوية . — تكون القوة المحصلة المؤثرة على الجسم صفراً .)
- (٥) نعبر عن قانون نيوتن الثالث بالعلاقة الرياضية
($F = ma$ / $\sum F = 0$ / $\sum F \neq 0$ / $F_1 = - F_2$)
- (٦) تبعاً للقانون الأول لنيوتن يتحرك الجسم بعجلة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية .
(منتظمة — منعدمة — غير منتظمة)
- (٧) إذا انعدمت القوة المحصلة المؤثرة على جسم متحرك فى خط مستقيم بسرعة منتظمة فإن الجسم
(تتوقف حركته — يتحرك بعجلة منتظمة — يظل متحركاً بسرعة منتظمة — يتحرك بسرعة غير منتظمة)
- (٨) وحدة قياس القوة هى النيوتن وكافئ
(kg.m/s^2 — kg.m/s — m/s^2 — kg.m/s^2)
- (٩) يسمى القانون الأول لنيوتن بقانون
(رد الفعل — بقاء الكتلة — القصور الذاتى — بقاء الطاقة)
- (١٠) إذا تضاعفت القوة المؤثرة على جسم مع ثبوت كتلته فإن العجلة تصبح
($4a$ — $2a$ — $\frac{1}{2}a$ — $\frac{1}{4}a$)
- (١١) يبقى الجسم الساكن ساكناً إذا أثرت عليه عدة قوى (كبيرة أفقية — متزنة — غير متزنة — صغيرة عمودية)
- (١٢) فى غياب قوة محصلة مؤثرة على جسم ساكن
(يتحرك الجسم بسرعة منتظمة — يتحرك الجسم بعجلة منتظمة — يظل الجسم ساكناً — يتحرك الجسم بسرعة غير منتظمة)
- (١٣) الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الأول هى
($F = ma$ / $\sum F = 0$ / $\sum F \neq 0$ / $F_1 = - F_2$)
- (١٤) تقاس القوة بواسطة
(الميزان ذو الكفتين — الأميتر — الميزان الزنبركى — المسطرة)
- (١٥) القانون الثالث لنيوتن يسمى قانون
(القصور الذاتى — رد الفعل — الجذب العام — كولوم)
- (١٦) المحصلة المؤثرة على جسم ما تساوى

- كتلة الجسم \times سرعته التى يتحرك بها .
 — كتلة الجسم \times المعدل الزمنى للتغير فى سرعته .
 (١٧) تعتمد فكرة الصاروخ على قانون
 (١٨) عند زيادة قوة الفعل للضعف فان قوة رد الفعل
 (تقل للنصف — تزداد أربعة أمثال — تزداد للضعف — لا يحدث لها تغير)
 (١٩) من خصائص قوة الفعل ورد الفعل أنهما
 (لهما نفس الطبيعة — لهما نفس الاتجاه — متعامدين — تؤثران على نفس الجسم)
 (٢٠) دراسة القصور الذاتى له أهمية فى
 (تجفيف الملابس — الأرجوحة الدوارة — الوقاية من شر الحوادث — صنع غزل البنات)
 (٢١) إذا كانت كتلة جسم 4 kg وكتلة جسم آخر 8 kg فان القصور الذاتى للجسم الثانى بالقصور الذاتى للجسم الأول
 (ضعف — نصف — ثلاثة أمثال — لا تربط علاقة)
 (٢٢) يبقى الجسم ساكناً إذا أثرت عليه
 (٢٣) إذا زادت كتلة الجسم الى ثلاث أمثالها فان قصوره الذاتى ... (يقال الى الثلث — يزداد الى ستة أمثاله — لا يتغير)
 (٢٤) يتناسب القصور الذاتى لجسم تناسباً طردياً مع
 (٢٥) يلزم لتغير حالة الجسم من حيث السكون أو الحركة وجود (قوة محصلة — اتزان إستاتيكي — قصور ذاتي)
 (٢٦) القوة كمية متجهة وحدة قياسها
 (٢٧) إذا زادت القوة المؤثرة على جسم متحرك للضعف وأنقصت كتلته للنصف فان العجلة التى يتحرك بها الجسم
 (تقل للنصف — تزداد للضعف — تزداد لأربع أمثالها)
 (٢٨) مقدار قوة جذب الأرض للجسم تسمى
 (٢٩) لو وجدت على كوكب عجلة الجاذبية على سطحه 1 m/s^2 عندئذ يكون وزنك يساوى عددياً
 (كتلتك — حجمك — طولك)
 (٣٠) وزن الجسم كمية
 (٣١) إذا زادت القوة المؤثرة على جسم للضعف وقلت كتلته للنصف فان العجلة
 (تظل ثابتة — تزداد للضعف — تزداد الى أربع أمثال)
 (٣٢) تتضاعف العجلة التى يتحرك بها جسم تحت تأثير قوة ثابتة إذا
 (تضاعفت كتلته — ظلت كتلة ثابتة — نقصت كتلته للنصف)
 (٣٣) تزداد كمية تحرك جسم بزيادة
 (٣٤) كرة كتلتها 0.5 kg تتحرك بسرعة جسم آخر كتلته 1 kg له نفس كمية التحرك
 (أقل من — تساوى — اكبر من)

س ٣ : ضع علامة (✓) أو علامة (x) أمام ما يأتى :

- إذا غابت القوة المحصلة المؤثرة على جسم متحرك فان الجسم يسكن .
- إذا زادت كتلة جسم الى الضعف فان قصوره الذاتى يقل للنصف .
- إذا أثرت قوتان على جسم ساكن ولم يتحرك فان محصلة القوى = صفر .
- تتوقف الكرة عن الحركة بعد فترة من دحرجتها على الأرض بسبب القصور الذاتى .
- الجسم الذى تكون كتلته كبيرة يكون قصوره الذاتى أقل .
- إذا نقصت القوة المؤثرة على جسم للنصف تزداد العجلة للضعف .
- إذا تضاعفت القوة المؤثرة على جسم ونقصت كتلته الى النصف فان العجلة تظل ثابتة .
- يزيد وزن أى جسم كلما ابتعد عن سطح الأرض .
- الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الثالث $\sum F = 0$

س ٤ : ما المقصود بكل من :

- ١- القانون الأول لنيوتن .
- ٢- القانون الثانى لنيوتن .
- ٣ - القانون الثالث لنيوتن .
- ٤- القوة .
- ٥- القصور الذاتى .
- ٦ - النيوتن .
- ٧- الكتلة .
- ٨- الوزن .
- ٩- كمية التحرك .

س ٥ : علل لما يأتى :

- (١) تتوقف الدراجة بعد فترة من إيقاف البدال .
- (٢) قد تؤثر قوتان أو أكثر على جسم دون أن تغير من حالته .
- (٣) السكون ليس المظهر الوحيد للجسم المتزن .
- (٤) يسمى القانون الأول لنيوتن باسم قانون القصور الذاتى .
- (٥) اندفاع الركاب الى الخلف إذا تحركت السيارة الى الأمام فجأة .
- (٦) سقوط قطعة النقود فى الكوب عند سحب الورقة فجأة .
- (٧) اندفاع الركاب فى السيارة الى الأمام عند توقفها فجأة .
- (٨) ينفع قائد الدراجة النارية للإمام عند اصطدامها بحاجز .
- (٩) ضرورة ارتداء حزام الأمان فى السيارة .
- (١٠) لا تحتاج صواريخ الفضاء عقب خروجها من الجاذبية الأرضية الى استهلاك الوقود .
- (١١) استمرار دوران المروحة بعد انقطاع التيار الكهربى عنها .
- (١٢) يصعب توقف الشاحنات الكبيرة المتحركة فجأة .
- (١٣) يصعب إيقاف جسم متحرك إذا كانت كتلته كبيرة .
- (١٤) يصعب تحريك جسم إذا كانت كتلته كبيرة .
- (١٥) القوة والوزن كميتان متجهتان .
- (١٦) تزداد العجلة التى يتحرك بها جسم بزيادة القوة المؤثرة عليه .
- (١٧) وزن الجسم الى سطح الأرض اكبر من كتلته عددياً .
- (١٨) يختلف الوزن عن الكتلة .
- (١٩) قوتا الفعل ورد الفعل رغم تساؤهما لا ينشأ عنهما إتران (محصلتهما لا تساوى الصفر) .
- (٢٠) لا توجد فى الكون قوة مفردة .
- (٢١) يثبت الجندي كعب البندقية فى تجويف الكتف .
- (٢٢) قانون نيوتن الثالث هو أساس عمل الصاروخ .
- (٢٣) كمية التحرك كمية متجهة .
- (٢٤) كمية التحرك لجسم ساكن تساوى صفر .
- (٢٥) قوة رد الفعل لها نفس طبيعة قوة الفعل .

س ٦ : ما معنى قولنا أن :

- ١- القوة المؤثرة على جسم = 60 N .
- ٢- وزن الجسم = 50 N .
- ٣- قوة جذب الأرض لجسم = 700 N .
- ٤- كمية التحرك لجسم = 10 kg.m/s .
- ٥- المعدل الزمني للتغير فى كمية التحرك لجسم ما = 55 kg.m/s² .

س ٧: قارن بين كل من :

- ١- الكتلة والوزن .
- (من حيث التعريف — النوع — العلاقة الرياضية — وحدة القياس — معادلة الأبعاد — التأثير بالمكان) .
- ٢- قوانين نيوتن الثلاثة . (من حيث : النص — الصيغة الرياضية)

س ٨ : متى يتساوى كل من ؟

- (١) القوة المؤثرة على جسم مع عجلة حركته .
- (٢) القوة المؤثرة على جسم مع كتلته .
- (٣) عجلة حركة جسم يتحرك مع كتلته .

س ٩ : متى تكون الكميات الآتية مساوية للصفر ؟

- ١- القوة المؤثرة على جسم .
- ٢- عجلة حركة جسم .
- ٣- كمية التحرك .

س ١٠ : اكتب العلاقة الرياضية التى تعبر عن :

- ١- القانون الأول لنيوتن .
- ٢- القانون الثالث لنيوتن .
- ٣- القانون الثانى لنيوتن .
- ٤- الوزن .
- ٥- الكتلة .

س ١١ : أسئلة متنوعة

- (١) إذا تحرك قطار فجاء للأمام ، فما الاتجاه الذى ستتحرك فيه حقيبة صغيرة موضوعة أسفل أحد المقاعد ؟ ولماذا ؟
- (٢) يمكن القول بان القانون الأول للحركة هو حالة خاصة من القانون الثانى ، وضح ذلك .
- (٣) قذف رائد فضاء جسمًا صغيراً فى اتجاه معين ، ماذا يحدث لهذا الرائد ؟ وفى ضوء ذلك اقترح طريقة لتتمكن المركبة الفضائية من تغيير اتجاهها خارج الغلاف الجوى .
- (٤) قارن بين ما يأتى مستخدماً (أكبر من — أصغر من — يساوى)
 - كتلة الجسم ووزنه على سطح الأرض .
 - العجلة التى يتحرك بها جسم كتلته 2kg والعجلة التى يتحرك بها جسم كتلته 4kg عند تأثرهما بنفس القوة .
 - عجلة السقوط الحر لجسم كتلته 2kg وعجلة السقوط الحر لجسم كتلته 4kg .
 - القوة التى يندفع بها الصاروخ لأعلى وقوة اندفاع الغازات المشتعلة لأسفل .

س ١٢ : ١- مسائل عامة للتدريب

- (١) ما قوة الجاذبية المؤثرة على شخص كتلته 50 kg عندما يكون سيارة تتحرك 3 m/s^2 علماً بان عجلة الجاذبية 9.8 m/s^2 .
- (٢) سحبت سيارة بقوة 6×10^3 فاكستبت عجلة قدرها 6 m/s^2 أحسب كتلة السيارة ووزنها . ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) .
- (٣) يتولى ونش المرور سحب سيارة بقوة 5000 N ليكسبها عجلة مقدارها 5 m/s^2 فإذا كانت عجلة الجاذبية 9.8 m/s^2 ، أحسب السرعة النهائية للجسم بعد 4s ، والمسافة التى تحركها الجسم خلال 4s .
- (٤) سيارة كتلتها 600 kg بدأت حركتها من السكون فى خط مستقيم تحت تأثير قوة محركها التى تعادل 1200 N وبعد مرور دقيقتين من بدء الحركة رأى قائدها طفلاً على بعد 120 m فاضطر للضغط على الفرامل حيث توقفت السيارة بعد ثانيتين من لحظة استخدامه للفرامل هل تصطدم السيارة الطفل أم لا ؟
- (٥) أوجد القوة اللازمة لتعجيل كتلة مقدارها 10 kg تتحرك فى خط مستقيم بحيث تتغير سرعتها 54 km/hr الى 108 km/hr خلال 10s .

(٦) تحركت سيارة كتلتها 1200 kg من السكون تحت تأثير قوة مقدارها 600N ، احسب العجلة التى تحركت بها السيارة وسرعة السيارة بعد زمن قدره 25 s ، والمسافة التى تقطعها السيارة . [0.5m/s², 12.5m/s, 156,25m]

(٧) جسم ساكن كتلته 20 kg أثرت عليه قوة مقدارها 30 N اوجد العجلة التى يكتسبها الجسم والزمن اللازم ليتحرك الجسم مسافة 75m . [1.5 m/s² , 10 s]

(٨) أثرت قوة مقدارها 24 N على جسم كتلته 5 kg فتحرك على مستوى أفقى بعجلة 3m/s² ، أحسب قوى الاحتكاك [9 N]

(٩) سيارة كتلتها 500 kg بدأت حركتها من السكون على طريق أفقى تحت تأثير قوة المحرك وقدرها 300 N ، فإذا كانت قوى الاحتكاك 50 N ، أوجد القوة المحركة للسيارة والعجلة التى تتحرك بها . [250 N , 0.5 m/s²]

(١٠) أثرت قوتان متساويتان على كتلتين مختلفين الأولى مقدارها 12 kg ، والثانية مجهولة ، فاكسبت الأولى عجلة مقدارها 3m/s² والثانية عجلة مقدارها 6m/s² ، فأحسب مقدار الكتلة المجهولة .

(١١) أثرت قوتان متساويتان على كتلتين الأولى 1 kg والثانية 2 kg فتحركت الأولى بعجلة 2 m/s² . اوجد العجلة التى تتحرك بها الثانية

(١٢) أثرت قوتان متساويتان على جسمين فتحرك الأول وكتلته 5 kg بعجلة قدرها 8 m/s² وتغيرت سرعة الثانى من السكون الى 48 m/s خلال 3 s فكم تكون كتلة الجسم الثانى .


(١٣) أثرت قوة قدرها 160 N على جسم فتغيرت سرعته من 20 m/s الى 30 m/s بعد أن قطع مسافة 25 m اوجد كتلة الجسم .

(١٤) أثرت قوة على جسم كتلته 10 kg فزادت سرعته من 5 m/s الى 10 m/s بعد أن قطع مسافة قدرها 25 m اوجد قيمة هذه القوة .

(١٥) تؤثر قوة على كتلة مقدارها 5 kg بحيث تنخفض سرعتها من 7 m/s الى 3 m/s فى زمن قدره 2s اوجد القوة المؤثرة بالنيوتن والمسافة التى تحركتها الكتلة خلال هذا الزمن .

(١٦) أحسب مقدار القوة التى تؤثر على جسم كتلته 7 kg بحيث تزيد سرعته من 10m/s الى 14m/s خلال 2s .

(١٧) مجموعة مكونة من ثلاث كتل كما بالشكل ، تتحرك بسرعة متغيرة تحت تأثير قوة محصلة $F = 30 \text{ N}$ ، احسب قوة الشد فى الخيط بين A و B وقوة الشد فى الخيط بين B و C . [5 N , 15 N]



(١٨) سيارة كتلتها 1200kg تتحرك بسرعة 20m/s أوقف قائدها المحرك لتتوقف خلال 5s احسب المسافة التى تقطعها السيارة خلال تلك الفترة وكذلك القوة المؤثرة على تلك السيارة خلال الفترة .

(١٩) جسم كتلته 50kg على سطح الأرض بحيث عجلة الجاذبية الأرضية 9.8m/s² اوجد وزن الجسم على سطح الأرض وكتلته على سطح القمر . [490 N , 50 kg]