


(ملخص منهج الجبر - الصف الثالث الإعدادي - ف٢)

ملخص منهج الجبر

$s + c = 0$ تسمى معادلة من الدرجة الأولى في متغيرين ولها عدد لا نهائي من الحلول في $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

$sc = 0$ تسمى معادلة من الدرجة الثانية في متغيرين

* لحل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين نرسم في المستوى الديكارتي المستقيمين الممثلين للمعادلتين ليكونا L_1 ، L_2 وتكون مجموعة الحل هي نقط تقاطع المستقيمين L_1 ، L_2



يمكن التعرف على عدد حلول أي زوج من معادلات الدرجة الأولى في متغيرين دون اللجوء للرسم البياني عن طريق ميل المستقيم الممثل للمعادلة ونقطة تقاطعه مع محور الصادات

نوجد ميل المستقيمين فإذا كان :

$$m_2 = m_1$$

$$m_2 \neq m_1$$

نوجد نقطتي تقاطع المستقيمين مع محور الصادات فإذا كان

ملاحظة هامة

(١) لإيجاد نقطة التقاطع مع محور الصادات
نضع $s = 0$ ونوجد قيمة c من المناظرة

النقطتان مختلفتين

النقطتان متساويتين

المستقيمان متوازيان
ويكون عدد الحلول = صفر

المستقيمان منطبقان ويكون لهما
عدد لا نهائي من الحلول

لإيجاد ميل المستقيم لدينا حالتين (١) إذا كان المستقيم على الصورة $as + b = 0$ يكون ميله $= -\frac{a}{b}$
(٢) إذا كان المستقيم على الصورة $sc = 0$ يكون ميل المستقيم يساوى معامل s (٢)

(ملخص منهج الجبر - الصف الثالث الإعدادي - ف٢)

تطبيقات على حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين

خطوات حل المسائل اللفظية

(١) نفرض أحد المجهولين s ، والآخر $ص$

(٢) من معطيات المسألة تكون معادلتين من الدرجة الأولى في s ، $ص$

(٣) نحل المعادلتين جبرياً أو بيانياً لنحصل على قيمة كل من s ، $ص$

خد بالك من الألفاظ الآتية (يزيد عن، يقل عن، ينقص عن) كلها بمعنى الطرح

(أضيف بمعنى الجمع) (كان الناتج ، بمقدار) يعني (=)

مثال توضيحي : إذا كان ضعف عدد الطالبات في احدى المدارس يزيد عن عدد الطلبة بمقدار ٥٠ وكان ثلاثة أمثل عدد الطالبات يقل عن ضعف عدد الطلبة بمقدار ٥٠ أوجد عدد كل من الطلبة والطالبات

الحل

نفرض عدد الطلبة = s

$$ص - s = 50 \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$\text{من } (1) \quad s = 2ص - 50 \quad \text{بالتعميض في } (2)$$

$$ص - 100 - 3ص = 50 \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

$$\therefore s = 2ص - 50 \quad \dots \dots \dots$$

$$\text{عدد الطالبات} = 100 \quad \text{طالبة} \quad , \quad \text{عدد الطلبة} = 250 \text{ طالب}$$

حل معادلتين في متغيرين أحدهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية

تعتمد طريقة حل معادلتين في متغيرين أحدهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية على طريقة التعميض والمثال التالي يوضح خطوات الحل

(ملخص منهج الجبر - الصف الثالث الإعدادي - ف2)

مثال : أوجد في ح مجموعة حل المعادلتين $s - c = 1$ ، $s^2 + c^2 = 13$

الحل

نبدأ بمعادلة الدرجة الأولى

$s = c + 1$ بالتعويض في المعادلة الثانية $(c+1)^2 + c^2 = 13$

$$c^2 + 2c + 1 + c^2 - 12 = 0 \quad \therefore c^2 + c^2 + 2c - 11 = 0$$

$$\therefore (c+3)(c-2) = 0 \quad \therefore c^2 + c - 6 = 0$$

$$\therefore c = 2 \quad \text{أو} \quad \therefore c = -3$$

$$\therefore s = 3 \quad \text{أو} \quad \therefore s = -1$$

$$\{(-1, 2), (2, 3), (3, -2)\}$$

حل معادلة الدرجة الثانية في مجهول واحد جبرياً باستخدام القانون العام

$$\text{القانون العام } s = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

ملحوظة :

قبل التعويض في القانون العام يجب وضع المعادلة في الصورة العامة $(as^2 + bs + c) = 0$

(1) المعادلة $s^2 - 6s - 7 = 0$ توضع على الصورة العامة كالتالي $s^2 - 6s + 7 = 0$

(2) $s - 3 = \frac{1}{s}$ (بضرب طرفي المعادلة $\times s$) $s \times s - s \times 3 = s \times \frac{1}{s}$

$s^2 - 3s + 1 = 0$ ثم عوض في القانون العام $\therefore s^2 - 3s - 1 = 0$


(ملخص منهج الجبر - الصف الثالثاعدادي - ف٢)

حل معادلة الدرجة الثانية في مجهول واحد بيانيا

الصورة العامة لمعادلة الدرجة الثانية في مجهول واحد هي


$$as^2 + bs + c = 0 \quad \text{حيث } a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$$

إذا كان $a < 0$




وتوجد لدينا ثلاثة حالات

المنحنى لا يقطع محور السينات




$$م . ح = \emptyset$$

المنحنى يقطع محور السينات في نقطة واحدة



$$م . ح = \{L\}$$

المنحنى يقطع محور السينات في نقطتين



$$م . ح = \{L, M\}$$

(ملخص منهج الجبر - الصف الثالث الإعدادي - ف2)

مجموعة أصفار دالة كثيرة

أي دالة تتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي

① المجال (قيم س) ② المجال المقابل (قيم ص المناظرة لقيم س)

③ قاعدة تعريف الدالة (والتي من خلالها يمكن التعرف على نوع الدالة)

فمثلاً: إذا كانت د : ص \rightarrow حيث د(س) = ٢س٢ + ٥س - ١

هنا نجد الآتي : المجال هو (ص) المجال المقابل هو (د)

وقاعدة التعريف هي د(س) = ٢س٢ + ٥س - ١

دالة كثيرة الحدود : هي دالة مجالها ح و مجالها المقابل ح

أصفار دالة كثيرة الحدود :

هي مجموعة قيم س التي تجل الدالة د(س) = صفر ونرمز لها بالرمز ص(د)

لاحظ الفرق بين كل من : د ، د(س) ، ص(د)

(١) د ترمز للدالة (٢) د(س) ترمز لقاعدة الدالة (٣) ص(د) ترمز لمجموعة أصفار الدالة د

مثال توضيحي أوجد مجموعة أصفار كل من دوال كثيرات الحدود المعرفة بالقواعد الآتية في ح

$$\textcircled{1} \quad \text{د}(س) = ٦ - ٢س^٢ \quad \text{د}(س) = ٦ - ٢س^٢$$

$$\textcircled{2} \quad \text{ن}(س) = ٩ + ٢س^٢ \quad \text{n}(s) = s^2 + 9$$

$$\textcircled{3} \quad \text{ق}(س) = \text{صفر} \quad \text{d}(s) = 9$$

الحل

$$\textcircled{1} \quad \text{بوضع } ٦ - ٢س^٢ = ٠ \quad \therefore \text{س} = ٣ \quad \text{ص}(د) = \{3\}$$

$$\textcircled{2} \quad \text{بوضع } ٩ + ٢س^٢ = ٠ \quad \therefore \text{س} = ٧ \quad \text{ص}(ك) = \{7, 0\}$$

$$\textcircled{3} \quad \text{بوضع } ٩ - ٧ \pm \sqrt{٩ - ٧} = ٠ \quad \therefore \text{ص}(د) = \emptyset$$

$$\textcircled{4} \quad \text{بوضع } ٩ - ٢س - ٥ = ٠ \quad \therefore (س - ٥)(س + ٣) = ٠ \quad \therefore \text{س} = ٥ \text{ أو س} = -٣$$

(ملخص منهج الجبر - الصف الثالث الإعدادي - ف٢)

$$\text{ص}(س) = \{3, 5\}$$

٥ ص(د) = \emptyset لأنه لا توجد قيمة لـ س تجعل الدالة د تساوى صفر

٦ ص(ق) = ح لأن جميع الأعداد الحقيقية تكون أصفار لهذه الدالة

دالة الكسر الجبري

دالة الكسر الجيري هي دالة قاعدتها على صورة كسر جيري كل من بسطه ومقامه عبارة عن قاعدة دالة كثيرة حدود

المجال المشترك لكسرين أو أكثر =
ح - {أصفار المقامات}

المجال = ح - {أصفار المقام}

مجموعة أصفار دالة الكسر الجيري = مجموعة أصفار البسط - مجموعة أصفار المقام

مثال توضيحي: إذا كان $D(s) = \frac{s^2 - 4}{s^2 - 25}$ ، $K(s) = \frac{s^2 - 5}{s^2 + 6}$

١) أوجد مجال كل من $D(s)$ ، $K(s)$

٢) أوجد كلا من ص(د) ، ص(ك)

الحل

١) مجال $D(s) = ح - \{5, -5\}$

٢) مجال $K(s) = ح - \{-2, 2\}$

٣) المجال المشترك للدالتين د ، ك = ح - {-5, 5, -2, 2}

٤) ص(د) = {5} - {5, -5} = \emptyset ، ص(ك) = {2} - {2, -2} = {2}

اختزال الكسر الجيري

تعريف

يقال إن الكسر الجيري في أبسط صورة له إذا لم توجد عوامل مشتركة بين بسطه ومقامه

(ملخص منهج الجبر - الصف الثالث الإعدادي - ف٢)

خطوات اختزال (اختصار) الكسر الجبري:

- ① نحل كلا من البسط والمقام تحليلًا كاملا
- ② نعين مجال الكسر الجبri قبل حذف العوامل المشتركة بين البسط والمقام
- ③ نحذف العوامل المشتركة بين بسط ومقام الكسر الجبri وبذلك نحل على أبسط صورة للكسر الجبri

تساوي كسريين جبريين

نقول إن الدالتين n_1 ، n_2 متساويتان إذا تحقق الشرطان الآتيان معا

$$② \text{ اختزال } n_1 = \text{ اختزال } n_2 \quad ① \text{ مجال } n_1 = \text{ مجال } n_2$$

ملحوظة : إذا كان مجال $n_1 \neq$ مجال n_2 ،

في هذه الحالة نقول أن الدالتين متساويتان في المجال المشترك
أو الدالتن تأخذان نفس القيم في المجال المشترك

$$d(s) = \frac{s+1}{s^2-9}$$

$$\text{المعكوس الضربى} = \frac{s^2-9}{s+1}$$

$$\text{المعكوس الجمعى} = \frac{-s-1}{s^2-9} \quad \text{أو} \quad \frac{s+1}{s^2-9} \quad \text{أو} \quad \frac{s+1}{s-9}$$

مجال المعكوس الجمعى = مجال الكسر الجبri

العمليات على الأحداث

التجربة العشوائية: هي تجربة تستطيع معرفة جميع نواتجها الممكنة قبل اجرائها ولكن لا يمكن تحديد الناتج الذي سيحدث فعلا .

فضاء العينة (F): هو مجموعة جميع النواتج الممكنة للتجربة العشوائية وعدد عناصرها N

الحدث: هو مجموعة جزئية من فضاء العينة فإذا كان M حدث في F فإن M ف عدد عناصره $n(M)$

وهو عدد فرص وقوع الحدث M

(ملخص منهج الجبر - الصف الثالث الإعدادي - ف2)

فيكون : احتمال أي حدث \mathcal{M} فيرمز له بالرمز $L(\mathcal{M})$ حيث

$$L(\mathcal{M}) = \frac{\text{عدد عناصر الحدث } (\mathcal{M})}{\text{عدد عناصر فضاء العينة}} \quad \text{ملاحظات: } \begin{cases} 1 \geq L(\mathcal{M}) \geq 0 & \text{أي أن } L(\mathcal{M}) \in [0, 1] \\ L(\mathcal{M}) = 1 & \text{احتمال الحدث المؤكد} \\ L(\mathcal{M}) = 0 & \text{احتمال الحدث المستحيل} \\ L(\mathcal{M}) = \text{صفر} & \text{العدد المتوقع لحدوث نوافذ معينة} = \text{احتمال حدوثها} \times \text{العدد الكلي للمفردات المعطاة} \end{cases}$$

$$\text{الإحداث المتنافية: } L(\mathcal{M} \cap \mathcal{B}) = 0$$

$$\text{يقال إن الحدثين } \mathcal{M}, \mathcal{B} \text{ متنافيان إذا كان } \mathcal{M} \cap \mathcal{B} = \emptyset \text{ ويكون } L(\mathcal{M} \cap \mathcal{B}) = 0$$

$$L(\mathcal{M} \cup \mathcal{B}) \text{ يعني احتمال وقوع الحدثين } \mathcal{M}, \mathcal{B} \text{ معاً}$$

$$L(\mathcal{M} \cup \mathcal{B}) \text{ يعني احتمال وقوع الحدثين } \mathcal{M} \text{ أو } \mathcal{B} \text{ أو كلاهما (أي احتمال وقوع أحدهما على الأقل)}$$

$$\text{إذا كان } \mathcal{M} \subset \mathcal{B} \text{ فإن } L(\mathcal{M} \cap \mathcal{B}) = L(\mathcal{M})$$

$$L(\mathcal{M} \cup \mathcal{B}) = L(\mathcal{B})$$

$$L(\mathcal{M} \cup \mathcal{B}) = L(\mathcal{M}) + L(\mathcal{B}) - L(\mathcal{M} \cap \mathcal{B}) \quad **$$

$$\text{إذا كان الحدثان } \mathcal{M}, \mathcal{B} \text{ متنافيان فإن } L(\mathcal{M} \cup \mathcal{B}) = L(\mathcal{M}) + L(\mathcal{B})$$

$$L(\mathcal{M} \cap \mathcal{B}) = L(\mathcal{M}) + L(\mathcal{B}) - L(\mathcal{M} \cup \mathcal{B})$$

الحدث المكمل : إذا كان \mathcal{M} حدثاً من فضاء العينة \mathcal{F} ($\mathcal{M} \subset \mathcal{F}$) فإن

الحدث المكمل للحدث \mathcal{M} يرمز له بالرمز \mathcal{M}^c وهو حدث عدم وقوع \mathcal{M} حيث

$$\mathcal{M} \cup \mathcal{M}^c = \mathcal{F} \quad \text{وبالتالي فإن } \mathcal{M} \cap \mathcal{M}^c = \emptyset \quad \text{حدثان متنافيان}$$

$$L(\mathcal{M} \cup \mathcal{M}^c) = 1 \quad \therefore L(\mathcal{M} \cap \mathcal{M}^c) = L(\mathcal{M}^c) = 1$$

$$L(\mathcal{M}) + L(\mathcal{M}^c) = 1 \quad \text{وبالتالي فإن } L(\mathcal{M}) = 1 - L(\mathcal{M}^c)$$

$$\text{ملحوظة: إذا كان } L(\mathcal{M}) = L(\mathcal{M}^c) \text{ فإن } L(\mathcal{M}) = \frac{1}{2}, L(\mathcal{M}^c) = \frac{1}{2}$$

$$* L(\mathcal{M} - \mathcal{B}) = L(\mathcal{M}) - L(\mathcal{M} \cap \mathcal{B}) \text{ وهو يعني وقوع الحدث } \mathcal{M} \text{ وعدم وقوع الحدث } \mathcal{B}$$

(ملخص منهج الجبر - الصف الثالث الإعدادي - ف٢)

أمثلة محلولة :

س١ : إذا كان Ω ، ب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية وكان $L(b) = \frac{1}{12}$ ، $L(\Omega \cap b) = \frac{1}{3}$ فأوجد $L(\Omega)$
إذا كان Ω ، ب متنافيين $\Omega \cap b \subset \Omega$

الحل

$$\therefore L(\Omega \cap b) = \text{صفر} \quad (1)$$

$$\therefore L(\Omega) = L(\Omega \cup b) - L(b) = \frac{1}{4} = \frac{1}{12} - \frac{1}{3} \quad (2)$$

$$\therefore L(\Omega \cup b) = L(\Omega) + L(b)$$

$$\therefore L(\Omega) = \frac{1}{3} \quad (2)$$

س٢ : إذا كان Ω ، ب حدثين متنافيين من فضاء عينة لتجربة عشوائية وكان $L(\Omega - b) = \frac{1}{6}$ ، $L(\Omega \cap b) = \frac{3}{5}$ فأوجد $L(\Omega)$
إذا كان Ω ، ب معا $L(\Omega - b) = \frac{1}{6}$

(3) احتمال عدم وقوع الحدثين Ω ، ب معا

الحل

$$\therefore L(\Omega - b) = L(\Omega) = \frac{1}{2} \quad (1)$$

$$\therefore L(\Omega \cap b) = L(\Omega) + L(b) \quad (2)$$

$$L(b) = \frac{1}{6} - \frac{3}{5} = \frac{1}{30} \quad (2)$$

$$\therefore L(\Omega \cap b) = \text{صفر} \quad (3)$$

$$\therefore \text{احتمال عدم وقوع الحدثين } \Omega \text{ ، ب معا} = L(\Omega \cap b) = 1 - L(\Omega) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

س٣ : إذا كان Ω ، ب حدثين متنافيين من فضاء عينة لتجربة عشوائية وكان $L(\Omega) = \frac{5}{9}$ ، $L(\Omega \cap b) = \frac{1}{9}$
 $L(b) = \frac{2}{9}$ أوجد (1) احتمال وقوع أحد الحدثين على الأقل

(2) احتمال وقوع أي من الحدثين (3) احتمال عدم وقوع أحد الحدثين دون وقوع الآخر

الحل

$$(1) \text{ احتمال وقوع أحد الحدثين على الأقل} = L(\Omega \cup b) = L(\Omega) + L(b) - L(\Omega \cap b) = \frac{2}{3}$$

$$(2) \text{ احتمال عدم وقوع أي من الحدثين} = L(\Omega \cap b^c) = 1 - L(\Omega \cup b) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$(3) \text{ احتمال وقوع أحد الحدثين دون وقوع الآخر} = L(\Omega \cap b^c) + L(\Omega \cap b) = \frac{5}{9} - \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$$

(ملخص منهج الجبر - الصف الثالث الاعدادي - ف٢)

س٤ : مجموعة بطاقة مرقمة من ١ إلى ٣٠ خلقت جيدا ، فإذا سحب منها بطاقة عشوائيا . احسب احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة تحمل

- ١) عدد مضاعفا للعدد ٨
٤) عددا مضاعفا للعدد ٦ أو ٨

الحل

قبل البدء في الحل يجب عليك أولاً أن تعرف ما معنى مضاعفات العدد مضاعفات أي عدد : هي كل الأعداد التي تقبل القسمة على هذا العدد وهي دائماً مجموعة لا نهائية من الأعداد ولكل تحصل على مضاعفات أي عدد بسهولة اضرب هذا العدد في ، ٣ ، ٢ ، ١ ، ٠ ،

١) مضاعفات العدد ٦ من ١ إلى ٣٠ هي ٦ ، ١٢ ، ١٨ ، ٢٤ ، ٣٠ وبالتالي يكون قيمة الاحتمال = $\frac{5}{30} = \frac{1}{6}$

٢) مضاعفات العدد ٨ من ١ إلى ٣٠ هي ٨ ، ١٦ ، ٢٤ وبالتالي يكون قيمة الاحتمال = $\frac{3}{30} = \frac{1}{10}$

٣) مضاعفات العددين ٦ ، ٨ معاً = {٦ ، ١٢ ، ١٨ ، ٢٤ ، ٣٠} \cap {٨ ، ١٦ ، ٢٤} = {١٦ ، ٢٤ ، ٣٠}

$$\therefore \text{قيمة الاحتمال} = \frac{1}{30}$$

٤) عدداً مضاعفاً للعدد ٦ أو ٨ = {٦ ، ١٢ ، ١٨ ، ٢٤ ، ٣٠} \cup {٨ ، ١٦ ، ٢٤} = {٦ ، ٧، ١٢، ١٨، ٢٤، ٣٠}

$\therefore \text{قيمة الاحتمال} = \frac{7}{30} = \frac{1}{4}$

س٥ : فصل دراسي به ٤٠ طالب نجح منهم ٣٠ طالباً في الرياضيات ، ٢٤ طالباً في العلوم ، ٢٠ طالباً في الامتحانين معاً ، فإذا اختير طالب عشوائيا . أوجد احتمال أن يكون الطالب المختار

١) ناجحاً في الرياضيات
٢) ناجحاً في أحد الامتحانين على الأقل

الحل

بفرض ١ هو حدث نجاح الطالب في الرياضيات ، ٢ هو حدث نجاح الطالب في العلوم

$$\therefore L(1) = \frac{3}{4} = \frac{3}{4} , L(2) = \frac{3}{5} = \frac{3}{5} , L(1 \cap 2) = \frac{3}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{20}$$

$$① \text{ناجحاً في الرياضيات} = L(1) = \frac{3}{4}$$

$$② \text{ناجحاً في العلوم فقط} = L(1 - 2) = L(1) - L(1 \cap 2) = \frac{3}{4} - \frac{9}{20} = \frac{3}{10}$$

$$③ \text{ناجحاً في أحد الامتحانين على الأقل} = L(1 + 2) - L(1 \cap 2) = L(1) + L(2) - L(1 \cap 2) = \frac{3}{4} + \frac{3}{5} - \frac{9}{20} = \frac{17}{20}$$